UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

6

Este Tomo de Mathematica de Uso del L.do Jub.do Dr Jn. Alcoholado con Lisenzia de Nro R.do Proal y apetiz.n suya se aplicó al Coleg.o dela Puris.a Concep.n dela Ziu.d de Murz.a

Costo cinco R.s

Orate pro me

Dr Juan Alcoholado

ARCHIMEDIS

DE IIS QVAE VEHVNTVR IN AQVA LIBRI DVO.

A' FEDERICO COMMANDINO VRBINATE IN PRISTINVM NITOREM RESTITVTI, ET COMMENTARIIS ILLVSTRATI.



CVM PRIVILEGIO IN ANNOS X.

BONONIAE,

Ex Officina Alexandri Benacii.

M D LXV.

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

RANVTIO FARNESIO
CARDINALI AMPLISSIMO
ET OPTIMO.

QVOD tibi superioribus diebus pollicitus sum, cum libellum Ptolemæi de Analemmate in lucem proferrem, breui fore, vt Archimedis etiam libri de ijs, quæ in aqua vehuntur, & emendatiores, & fortasse opera mea illustriores ederentur: mihi non committendum esse duxi, vt iure optimo malum nomen, præsertim à te, cui tantopere debeo, existimari possem. quamuis cum mecum considero suscepti negocij difficultates, quas multo plures, & multo grauiores, quàm in libello de Analemmate deprehendi; vereor ne id planè non assecutus sim, quod ab initio spectaui, vt mathematicarum disciplinarum studiosis hac in parte satisfacerem. cum enim græcus Archimedis codex nondum in lucem venerit, non solum is, qui eum latinitate donauit, multis in locis fœde lapsus est, verum etiam codex ipse, vt etiam interpres fatetur, vetustate corruptus, & mancus est; duæq; integræ ἀποδείξεις, quas demonstrationes dicimus, deperierunt. quæ iactura quantam vim habeat ad perturbandum admirabilem illum ordinem, quo inter se mathematicæ disciplinæ quodāmodo connexæ sunt,

tibi, qui iam in iis multam operam, multumq; ſtudium poſuiſti, cogitandum relinquo. nonnulla præterea Archimedes vt perſpicua in his tractandis ponere non dubitauit, quæ veteres mathematici, qui de conicis conſcripſerunt, plurimis, & firmiſsimis argumentis probauerũt. Hæc autem idcirco à nobis omnino ignorantur; quòd poſtremi quatuor libri conicorum Apollonii Pergæi adhuc in tenebris deliteſcunt. Qua quidem in re (vt mea fert opinio) ſingulari fato fuerunt mathematicæ diſciplinæ, cum tot ſcriptorum præclara monumenta interierint, per quæ non ſolum in ſtudioſos homines, uerum etiam in humanũ genus mirabiles utilitates importatæ fuiſſent. nam cum mecum conſidero quàm late pateant hæ nobiliſsimæ ſcientiæ, quãtopere rebus publicis & priuatis admirabili quadã ratione, atque ordine gubernandis neceſſariæ ſint, dubitãdum non exiſtimo, quin magna ſit habenda gratia huius diuini boni auctoribus, & inuentoribus: ueterumq; græcorum prudentiam ſatis admirari non poſſum, qui pueros cum primum fari cœpiſſent, his diſciplinis imbuendos curabant, ut à prima ætate multiplicis, ac ſubtilis ſcientiæ contemplationi aſſueti nihil paruum, aut humile cogitarent: ſed uel ſe totos ijs artibus traderent, quarum ope ciuitatibus ſuis & præſidio, & ornamento eſſe poſſent: uel humanis ſtudijs multam ſalutem dicentes, diuinam philoſophiam toto animo amplexarentur, cum ad eam per mathematicas diſciplinas fa-

ciliorem sibi aditum comparassent. quamobrem grauissimum damnum factum est in tot præstãtissimis uiris: quorũ scripta si in manus nostras peruenissent, profecto multo præclarius cum rebus humanis ageretur. complures enim, qui nunc tot difficultatibus ab his studijs deterrentur, hac ratione priuatis & publicis rationibus optime consuluissent. Cum hæc ita essent, tamen nullum mihi laborem subterfugiendũ esse iudicaui, quo studiosis hominibus, qui in mathematicis disciplinis toto animo incumbũt, facilior pateret aditus ad abstrusa, & recondita sensa tanti scriptoris intelligenda: nec à uetere meo instituto discedere uolui; scis enim me multos abhinc annos hanc eandem prouinciam, Archimedis quàm plurima scripta illustrandi suscepisse. quod neque arrogãtia, nec inanis gloriæ spe adductus sum, ut facerẽ, sed me uehementer in hanc mentem impulit honestissima cupiditas de studiosis hominibus benemerẽdi: etenim semper mea fuit sentẽtia, mathematicum, qui libros Archimedis accuratissime non euoluerit, uix mathematicum appellari debere: cum eũ necesse sit in multarum rerum ignoratione uersari, sine quibus mathematicæ disciplinæ imperfectæ quodammodo, atque inchoatæ sunt habendæ. Dedi igitur operam, ut his etiam Archimedis libris, quoad eius fieri posset, per me aliqua lux afferretur. quos ut Archimedis esse nõ dubitarem, duæ non contemnendæ causæ fuerunt. una quòd in tanta obscuritate ab interpretis inscitia,

UNIVERSIDAD DE MURCIA

& à uetuſtate profecta, neſcio quod ueſtigium illius acuti, & perſpicacis ingenij, quo Archimedes excelluit, impreſſum appareat: altera quòd tum græci, tum latini ſcriptores grauiſſimi hos ut Archimedis libros recognoſcũt. Strabo enim in primo libro hæc ad uerbũ ſcribit. ὁδὲ οὕτος ἁδὺς ἐστὶν, ὥστε καὶ μὴ μαθηματικὸς ὢν, οὐδὲ τὴν Ἀρχιμήδους βεβαιοῖ δόξαν, ὅτι φησὶν ἐκεῖνος ἐν τοῖς περὶ τῶν ὀχουμένων, παντὸς ὑγροῦ καθεστηκότος, καὶ μένοντος τὴν ἐπιφάνειαν σφαιρικὴν εἶναι, σφαίρας τοῦτο κέντρον ἐχούσης τὴν γῆν. ταύτην γὰρ τὴν δόξαν ἀποδέχονται πάντες οἱ μαθημάτων πῶς ἁπτόμενοι. & Pappus Alexandrinus in octauo mathematicarum collectionum libro hæc ſcripta reliquit, καλοῦσι δὲ μηχανικοὺς οἱ παλαιοὶ, καὶ τοὺς θαυμασιουργοὺς, ὧν οἱ μὲν διὰ πνευμάτων φιλοτεχνοῦσιν, ὡς ἥρων πνευματικοῖς, οἱ δὲ διὰ νευρίων καὶ σπάρτων ἐμψύχων κινήσεις δοκοῦσι μιμεῖσθαι, ὡς ἥρων αὐτοματοῖς, καὶ ζυγίοις: ἄλλοι δὲ διὰ τῶν ἐφ' ὕδατος ὀχουμένων, ὡς ἀρχιμήδης ὀχουμένοις. Vitruuius etiam in octauo libro de his eiſdem Archimedis libris meminit. Fortaſſe, inquit, qui Archimedis libros legit, dicet non poſſe fieri ueram ex aqua librationem: ſed ei placet aquam non eſſe libratam, ſed ſphæroides habere ſchema: & ibi habere centrum, quo loci habet orbis terrarum. ut nemini dubium eſſe poſſit, quin & genere ſcriptionis, & tãtorum uirorum auctoritate, ut germani Archimedis libri attente legendi, & perpendendi ſint: præſertim cum in ijs multa continean tur cognitione digniſſima, quæ nõ tam ad mathema ticas diſciplinas, quàm ad naturæ obſcuritatem ſpectant. Quamobrem ego ne tanto, & tam fructuoſo theſauro diutius ſtudioſi carerent, primum loca par-

UNIVERSIDAD DE MURCIA

tim interpretis errore deprauata emendaui; partim uetuſtate corrupta & conſumpta in priſtinam integritatem redegi, compluribus, quæ deſiderabantur, meo, ut aiunt, marte ſuppletis. Deinde quoniam Archimedes, quemadmodum ſupra dixi, non nulla ponit, ut perſpicua, & quæ uel ipſe, uel ſuperiores mathematici ἀποδείξει confirmauerunt, coactus ſum non ſine maximo negotio ex ijs principijs conicæ diſcipli næ Apollonij Pergæi, quæ in manus noſtras peruenerũt, nouas probationes adhibere, nequid eſſet, quod diligentem lectorem in hac parte remorari poſſet. reſtabat, ut theorema illud, quod ſine cognitione centri grauitatis corporum ſolidorũ percipi non poteſt, uidelicet, Centrum grauitatis in portionibus conoidis rectanguli axem ita diuidere, ut pars, quæ ad uerticem terminatur, reliquæ partis, quæ ad baſim ſit dupla, certiſſimis rationibus comprobarem. ſed huic quoque rei prouiſum eſt à me: ſeorſumq; ab his libris de cẽtro grauitatis ſolidorũ uberrime cõſcripſi. denique nihil prætermiſi, quod ad Archimedem in hac materia illuſtrandum attineret. quod ſi, ut ſpero, aſſecutus ſum, ſatis magnum fructum mihi cepiſſe uidebor laborum, & uigiliarum mearum: ſin ſecus acciderit, hoc me tamen conſolabor, quòd omnes intelligent, honeſtiſſimo meo conſilio, non tã ingenij mei imbecillitatem, quàm rei obſcuritatem, & temporũ iniurias obſtitiſſe. Hoc loco ſuperuacaneum eſſe arbitror pluribus uerbis exponere, cur tibi amplisſime

Cardinalis, has lucubrationes meas dicare constituerim. tantis enim beneficijs à te affectus, quanta semper & meminero, & prædicabo; tanta liberalitate cõplexus, quantam ne optare quidem unquam ausus essem. cupio memorem, & erga te gratum animũ qua ratione possum, ostendere. quãuis si de te nihil aliud præter auditum haberem, si amplitudini tuæ tantopere deuinctus non essem; tua in omni genere disciplinarum excellentia, tua grauitas, atque innocentia me magnopere hortata esset, ut te potissimum delegerem, sub cuius clarissimi nominis splendore hi Archimedis libri ab obliuione hominum, atque à silentio uindicarentur. uerecundius de te in præsentia dicerem, ne uiderer assentationi potius, quàm ueritati seruire; nisi omnibus persuasissimum esset, diuinas & inauditas uirtutes tuas cum singulari eruditione coniunctas in illo sanctissimo Reip. christianæ consilio tanquam lumen aliquod elucere. quamobrem ea, qua soles, benignitate, fidelissimi clientis tui munus accipies; quod tibi, qui & mathematicis disciplinis, & phisiologiæ studijs tantopere delectaris, non iucundum fore confido. Vale.

Federicus Commandinus.

UNIVERSIDAD DE MURCIA

ARCHIMEDIS DE IIS QVAE VEHVNTVR IN AQVA LIBER PRIMVS.

CVM COMMENTARIIS FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS.

POSITIO.

ONATVR humidi eam esse naturam, vt partibus ipsius æqualiter iacentibus, & continuatis inter se se, minus pressa à magis pressa expellatur. Vnaquæque autem pars eius premitur humido supra ipsam existente ad perpendiculum, si humidum sit descendens in aliquo, aut ab alio aliquo pressum.

PROPOSITIO I.

SI superficies aliqua plano secetur per idē semper punctum; sitq; sectio circuli circunferentia, centrum habens punctum illud, per quod plano secatur: sphæræ superficies erit.

SECETVR superficies aliqua plano per k punctum ducto: & sic sectio semper circuli circunferentia, centrum habens punctum k. Dico eam sphæræ superficiem esse. Si enim non est sphæræ superficies; rectæ lineæ, quæ à puncto k ad circunferentiam ducuntur non omnes æquales erunt. Itaque sint a b puncta in superficie; & inæquales lineæ a k k b: per ipsas autem a k k b planum ducatur, quod sectionem faciat in superficie lineam d a b c. ergo d a b c circuli circunferentia est, cuius centrum k; quoniam superficies eiusmodi ponebatur: & idcirco æquales inter se sunt a k k b, sed & inæquales; quod fieri non potest. constat igitur superficiem eam esse sphæræ superficiem.



PROPOSITIO II.

OMNIS humidi consistentis, atque manentis superficies sphærica est; cuius sphæræ centrũ est idem, quod centrum terræ.

INTELLIGATVR humidũ consistens, manẽsq;: & secetur ipsius superficies plano per centrum terræ ducto. sit autem terræ centrum k: & superficiei sectio, linea a b c d. Dico lineam a b c d circuli circunferentiam esse, cuius centrum k. Si enim non est, rectæ lineæ à puncto k ad lineam a b c d ductæ non erunt æquales. Sumatur recta linea quibusdam quidem à puncto k ad ipsam a b c d ductis maior; quibusdam uero minor: & ex centro k, interual-

loq;

loq; lineæ ſumptæ circulus deſcribatur. cadet ergo ipſius circunferentia partim extra lineam a b c d, partim intra; quoniam ea, quæ ex centro quibuſdam quidem à puncto k ad ipſam ductis eſt maior; & quibuſdam minor. Itaq; ſit circuli deſcripti circunferentia f b h: & ex b ad k ducta linea, iungãtur f k k h e,



quæ angulos æquales faciant. deſcribatur autem & ex centro k circunferentia quædam x o p in plano, & in humido. ergo partes humidi, quæ ſunt ad circunferentiam x o p æqualiter iacent, ac continuatæ inter ſe ſe: & premũtur quidem partes, quæ ad x o circunferentiam, humido, quod loco a b continetur: quæ uero ad circunferentiam o p premuntur humido, quod continetur b e. inæqualiter igitur premuntur partes humidi ad circunferentiã x o, & ad o p. quare minus preſſæ à magis preſſis expellentur. non ergo conſiſtet humidum. Atqui ponebatur conſiſtens, & manens. neceſſarium eſt igitur lineam a b c d eſſe circuli circunferentiam, cuius centrum k. Similiter autem demonſtrabitur, & ſi quomodocunque aliter ſuperficies humidi plano ſecta fuerit per centrum terræ; ſectionem circuli circunferentiam eſſe: & centrum ipſius eſſe, quod & terræ centrum. Ex quibus conſtat ſuperficiem humidi conſiſtentis, atque manentis ſphæricam eſſe: & eius ſphæræ centrum idem, quod centrum terræ: quoniam eiuſmodi eſt, ut ſecta per idem ſemper punctum ſectionem faciat circuli circunferentiam, centrum habentis punctum illud, per quod ipſa plano ſecatur. Prima huius.

PROPOSITIO III.

SOLIDARVM magnitudinum, quæ æqualē molem habentes æque graues sunt, atque humidum; in humidum demissæ demergentur ita, vt ex humidi superficie nihil extet: non tamen ad huc deorsum ferentur.

SIT magnitudo aliqua æque grauis, atque humidum: & si fieri potest, in humidum demissa extet ex superficie ipsius: consistat autem humidum, maneatq; : & intelligatur aliquod planum ductū per cētrum terræ, & humidi, ac per solidam magnitudinem, ut sit superficiei quidem humidi sectio a b c d; solidæ uero magnitudinis insidentis e h t f; & terræ centrum k: sitq; solidæ magnitudinis pars, quæ in humido est, b h t c; &



quæ extra humidum b e f c. intelligatur etiam solida figura comprehensa pyramide, basim quidem habente parallelogrammum, quod est in superficie humidi; uerticem autem centrum terræ: sitq; sectio plani, in quo est a b c d circunferentia, & planorum pyramidis k l, k m: & describatur quædam alterius sphæræ superficies x o p circa centrū k, in humido sub e f h t, ut sit ipsa x o p sectio facta à superficie plani. Sumatur præterea alia quædam pyramis æqualis, & similis comprehendenti solidam figuram, ipsi coniuncta,

iuncta,& continuata: sitq; sectio planorũ ipsius K m K n: & in humido intelligatur quædam magnitudo r s q y ex ipso humido constans, æqualis, & similis solidæ b h t c, quæ quidem pars est solidæ magnitudinis in humido demersa. partes igitur humidi, quæ scilicet in prima pyramide superficie x o continetur,& quæ in altera continetur p o, æqualiter sunt positæ, & continuatæ; sed non similiter premuntur. nam contenta quidem x o, premitur solido e h t f, & humido interiecto inter superficies x o, l m,& plana pyramidis; contenta uero p o premitur solido r s q y,& humido inter superficies o p, m n,& pyramidis plana interiecto. minor autem est grauitas humidi, quod est inter m n, o p, quàm eius, quod inter l m, x o. solidum enim r s q y est minus solido e h t f: cum sit æquale ipsi b h t c; quia magnitudine æquale,& æque graue ponitur solidum, atque humidum: reliquum autem reliquo inæquale est. constat igitur partem contentã superficie o p, expelli ab ea, quæ ipsa x o continetur: & non consistere humidum. ponebatur autem consistens,& manens: non ergo ex superficie humidi extat aliquid solidæ magnitudinis. sed neque demersum solidum ad inferiora feretur. Similiter enim prementur omnes partes humidi æqualiter positæ, cum solidum sit æque graue, atque humidum.

PROPOSITIO IIII.

SOLIDARVM magnitudinum, quæcunque leuior humido fuerit, demissa in humidum non demergetur tota, sed aliqua pars ipsius ex humidi superficie extabit.

SIT magnitudo solida humido leuior; & demissa in humidum demergatur tota, si fieri potest, ut nulla pars ipsius

extet ex humidi ſuperficie. conſiſtat autem humidum, ma neatq; : & intelligatur aliquod planum ductum per centrũ terræ, per humidum, & per magnitudinem ſolidam : à quo ſuperficies quidem humidi ſecetur ſecundum circunferentiam a b c ; ſolida autem magnitudo ſecundum figuram, in qua r : & centrum terræ ſit K. Intelligatur etiam quædam pyramis comprehendens



figuram r, ſicuti prius, quæ pũctum K pro uertice habeat : ſecenturq; ipſius plana à ſuperficie plani a b c ſecundum a K K b : & ſumatur pyramis alia æqualis, & ſimilis ſuperiori, cuius plana ſecentur à plano a b c, ſecundum b K K c : deinde alterius ſphæræ ſuperficies quædam deſcribatur in humido circa centrum K, ſub ſolida magnitudine : & ſecetur ab eodem plano ſecundum x o p : poſtremo intelligatur alia magnitudo h in poſteriori pyramide, quæ ex humido conſtet, & ſolidæ magnitudini r ſit æqualis. partes igitur humidi, & quæ in prima pyramide continetur ſuperficie x o ; & quæ in ſecunda ſuperficie o p continetur, æqualiter iacent, & continuatæ inter ſe ſe ; non tamen ſimiliter premuntur : nam quæ eſt in prima pyramide premitur magnitudine ſolida r, & humido cõtinente ipſam, quod eſt in loco pyramidis a b o x : quæ uero in altera pyramide premitur ſolida magnitudine h, & humido ipſam continente in loco pyramidis p o b c. At grauitas ſolidæ magnitudinis r, minor eſt grauitate humidi, in quo h : quoniam magnitudo ſolida mole quidem æqualis, & humido leuior ponitur : grauitas autem humidi continentis magnitudines r h eſt æqualis ; cum pyramides æquales ſint. magis ergo premi-

premitur pars humidi, quæ est sub superficie o p. quare expellet partem minus pressam, & non manebit humidum. ponebatur autem manens. non igitur demergetur tota, sed aliqua pars ipsius ex humidi superficie extabit.

PROPOSITIO V.

SOLIDARVM magnitudinum quæcunque leuior humido fuerit, demissa in humidum vsque eô demergetur, vt tanta moles humidi, quanta est partis demersæ, eandem, quam tota magnitudo, grauitatem habeat.

DISPONANTVR eadem, quæ supra: sitq; humidum manens: & magnitudo e h t f humido leuior. Si igitur humidum manet, similiter prementur eius partes, quæ æqualiter iacent. similiter ergo premetur humidum sub superficiebus x o o p. quare æqualis est grauitas, qua premuntur. est autem & grauitas humidi, quod in prima pyramide absque solido b h t c, æqualis grauitati humidi, quod in altera pyramide absq; r s q y humido. perspicuum est igitur grauitatem magnitudinis e h t f grauitati humidi r s q y æqualem esse. ex quibus constat, tantam humidi molem, quanta est pars demersa solidæ magnitudinis, eandem, quam tota magnitudo habere grauitatem.



PROPOSITIO VI.

SOLIDAE magnitudines humido leuiores, in humidum impulsæ sursum feruntur tanta ui, quã to humidum molem habens magnitudini æqualem, grauius est ipsa magnitudine.

SIT enim magnitudo a leuior humido: & sit magnitudinis quidem a grauitas b: humidi uero molem habentis æqualem ipsi a, grauitas sit b c. demonstrandum est magnitudinem a in humidum impulsam tanta ui sursum ferri, quanta est grauitas c. accipiatur enim quædam magnitudo, in qua d habens grauitatem ipsi c æqualem. Itaque magnitudo ex utrisque magnitudinibus constans, in quibus a d, leuior est humido: nam magnitudinis quidem quæ ex utrisque constat grauitas est b c; humidi uero habentis molem ipsis æqualem grauitas maior est, quàm b c: quoniam b c grauitas est humidi molẽ habentis æqualem ipsia. Si ergo demittatur in humidũ magnitudo ex utrisque a d constans; usque eò demergetur, ut tanta moles humidi, quanta est pars magnitudinis demersa eãdem, quam tota magnitudo grauitatem habeat. hoc enim iam demonstratum est. sit autẽ superficies humidi alicuius a b c d circunferentia. Quoniam igitur tanta moles humidi, quanta est magnitudo a grauitatem habet eandem, quam magnitudines a d: perspicuum est partem ipsius demersam esse magnitudinem a; reliquam uero d totam ex humidi



midi superficie extare. * Quare constat magnitudinem a tanta ui sursum ferri, quãta deorsum premitur ab eo, quod est supra; uidelicet à d, cũ neutra ab altera expellatur, sed d fertur deorsum tanta grauitate, quanta est c: ponebatur enim grauitas eius, in quo d ipsi c æqualis. patet igitur illud quod demonstrare oportebat.

PROPOSITIO VII.

SOLIDAE magnitudines humido grauiores demissæ in humidum ferentur deorsum, donec descendant: & erunt in humido tanto leuiores, quanta est grauitas humidi molem habentis solidæ magnitudini æqualem.

SOLIDAS magnitudines humido grauiores, in humidum demissas deorsum quidam ferri, donec descẽdant, manifestum est: partes enim humidi, quæ sub eis sunt, premuntur magis, quàm partes æqualiter ipsis adiacentes; quoniam magnitudo solida humido grauior ponitur: leuiores autem esse uti dictum est, demonstrabitur hoc modo. Sit enim aliqua magnitudo a grauior humido: & sit magnitudinis quidem a grauitas b c: humidi uero molẽ habentis æqualem ipsi a grauitas sit b. demonstrandum est magnitudinem a in humido existẽtem habere grauitatem æqualem ipsi c. Accipiatur enim alia aliqua magnitudo, in qua d, leuior humido;



cuius grauitas sit ipsi b æqualis: humidi uero molem habentis æqualem magnitudini d, sit grauitas æqualis b c. Itaque compositis magnitudinibus a d, magnitudo ex utriusque constans æque grauis erit, atque ipsum humidū: grauitas enim utrarūque magnitudinum est æqualis utriusque grauitatibus, uidelicet b c, & b: grauitas autem humidi habentis molem æqualem utriusque magnitudinibus, est eisdem grauitatibus æqualis. Demissis igitur magnitudinibus, & in humidum proiectis æque graues erunt, atque humidum: neque sursum, neque deorsum ferentur: quoniam magnitudo quidem a grauior humido feretur deorsum; & eadem ui à magnitudine d sursum retrahetur: magnitudo autem d humido leuior feretur sursum tanta ui, quanta est grauitas c: demōstratū enim est magnitudines solidas humido leuiores, impulsas in humidum tanta ui retrahi sursum, quanto humidum habens molem magnitudini æqualem grauius est ipsa magnitudine. At humidum molem habens æqualem d, grauius est, quam d, ipsa c grauitate. Constat igitur magnitudinem a deorsum ferri tanta grauitate, quanta est c: quod demonstrare oportebat.



6. huius.

POSITIO II.

PONATVR eorum, quæ in humido sursum feruntur, vnumquodque sursum ferri secundum perpendicularem, quæ per centrum grauitatis ipsorum ducitur.

COM-

UNIVERSIDAD DE MURCIA

COMMENTARIVS.

At uero ea, quæ feruntur deorsum, secundum perpendicularem, quæ per centrum grauitatis ipsorum ducitur, similiter ferri, uel tanquam notum, uel ut ab alijs positum prætermisit.

PROPOSITIO VIII.

SI aliqua magnitudo solida leuior humido, quæ figuram portionis sphæræ habeat, in humidum demittatur, ita vt basis portionis non tangat humidum: figura insidebit recta, ita vt axis portionis sit secundum perpendicularem. Et si ab aliquo inclinetur figura, vt basis portionis humidum cõtingat; non manebit inclinata si demittatur, sed recta restituetur. A B

[INTELLIGATVR quædam magnitudo, qualis dicta est, in humidum demissa: & ducatur planum per axẽ portionis, & per terræ centrum, ut sit superficiei humidi sectio circũferentia a b c d: & figuræ sectio e f h circunferentia: sit autem e h recta linea; & f t axis portionis. Si igitur inclinetur figura, ita ut axis portionis f t non sit secundum perpendicularem. demonstrandum est, non manere ipsam figuram; sed in rectum restitui. Itaque centrum sphæræ est

Suppleta a Federico Cõm.



in linea f t. nam ſit primum figura maior dimidia ſphærę: ſitq; in dimidia ſphæra ſphęræ centrum t; in minori portione ſit centrum p; & in maiori k: per k uero, & terræ centrum l ducatur k l ſecans circunferentiam e f h in puncto n. Quoniam igitur unaquæque ſphæræportio axem habet in linea, quæ à cẽtro ſphæræ ad eius baſim perpendicularis ducitur: habetq; in axe grauitatis centrum: portionis in humido demerſæ, quæ ex duabus ſphæræ portionibus conſtat, axis erit in perpendiculari per k ducta. & idcirco centrum grauitatis ipſius erit in linea n k, quod ſit r. ſed totius portionis grauitatis centrum eſt in linea f t inter k, & f, quod ſit x. reliquæ ergo figuræ, quæ eſt extra humidum, centrum erit in linea r x producta ad partes x; & aſſumpta ex ea, linea quadam, quæ ad r x eandem proportionem habeat, quam grauitas portionis in humido demerſæ habet ad grauitatem figuræ, quæ eſt extra humidum. Sit autem s centrum dictæ figuræ: & per s ducatur perpendicularis l s. Feretur ergo grauitas figuræ quidem, quæ extra humidum per rectam s l deorſum; portionis autem, quæ in humido, ſurſum per rectam r l. quare non manebit figura: ſed partes eius, quæ ſunt ad e, deorſum; & quæ ad h ſurſum ferẽtur. idq; cõtinenter fiet, quoad f t ſit ſecundum perpendicularem. Eodem modo in aliis portionibus idem demonſtrabitur.]

C
D
E
F





COMMENTARIVS.

Hvivs propositionis demonstratio iniuria temporum desideratur, quam nos ita restituimus, ut ex figuris, quæ remanserunt Archimedem scripsisse colligi potuit: neque enim eas immutare uisum est, quæ uero ad declarationem, explicationémque addenda fuerant, in commentarijs suppleuimus, id quod etiam præstitimus in secunda propositione secundi libri.

SI aliqua magnitudo solida leuior humido.] *Ea uerba, leuior humido, nos addidimus, quæ in translatione non erant; quoniam de eiusmodi magnitudinibus in hac propositione agitur.* A

In humidũ demittatur, ita ut basis portionis nõ tangat humidum.] *Hoc est in humidum ita demittatur, ut basis sursum spectet; uertex autem deorsum. quod quidem opponitur ei, quod in sequenti dixit.* In humidum demittatur, ita ut basis tota sit in humido. *His enim uerbis significat portionem oppositio modo in humidum demitti, ut scilicet uertex sursum; basis autem deorsum uergat. eodem dicendi modo frequenter usus est in secundo libro; in quo de portionibus conoidis rectanguli tractatur.* B

Quoniã igitur unaquæq; sphæræ portio axẽ habet in linea, quæ à cẽtro sphæræ ad eius basim perpẽdicularis ducitur.] *Iungatur enim b c, & k l secet circunferentiam a b c d in puncto g; lineam uero rectam b c in m. & quoniam duo circuli a b c d, e f h secant se se in punctis b c; recta linea, quæ ipsorum centra coniungit, uidelicet k l lineam b c bifariam, & ad angulos rectos secat: ut in commentarijs in Ptolemæi planisphærium ostendimus. quare portionis circuli b n c diameter est m n; & portionis b g c diameter m g: nam rectæ lineæ, quæ ipsi b c æquidistantes ex utraque parte ducuntur, cum linea n g rectos angulos faciunt; & idcirco ab ipsa bifariam secantur. portionis igitur sphæræ b n c axis est n m; & portionis b g c axis m g. ex quo sequitur, portionis in humido demersæ axem esse in linea k l; ipsam scilicet n g. & cum grauitatis centrum cuiuslibet sphæræ portionis sit in axe; quod nos in libro* C

29. primi

3. tertii.

de c[illegible]gravitatis solidorum demonstrauimus: erit magnitudinis ex utrisque portionibus b n c, b g c constantis; hoc est portionis in humido demersæ grauitatis centrum in linea n g, quæ ipsarum sphæræ portionum centra grauitatis coniungit. si enim fieri potest, sit extra lineam n g, ut in q: sitq; portionis b n c centrum grauitatis u; & ducatur u q. Quoniam igitur à portione in humido demersa aufertur sphæræ portio b n c, non habens idem centrum grauitatis: erit ex octaua primi libri Archimedis de centro grauitatis planorum, reliquæ portionis b g c centrum in linea u q producta. quod fieri non potest; est enim in axe ipsius m g. sequitur ergo ut portionis in humido demersæ centrum grauitatis sit in linea n k. quod ostendendum proposuimus.



D Sed totius portionis grauitatis centrum est in linea f t, inter k, & f, quod sit x.] *Compleatur sphæra, ut sit portionis additæ axis t y; & centrũ grauitatis z. Itaque quoniã à tota sphæra, cuius grauitatis cẽtrum est k, ut etiam in eodem libro demõstrauimus, auferatur portio e y h centrũ grauitatis habens z: erit reliquæ portionis e f h cẽtrũ in linea z k producta. quare inter k & f necessario cadet.*

8. primi Archimedis.

E Reliquæ ergo figuræ, quæ est extra humidum, centrum erit in linea r x producta.] *Ex eadem octaua primi libri Archimedis de centro grauitatis planorum.*

F Feretur ergo grauitas, figuræ quidem quæ extra humidum per rectam s l deorsum; portionis autem, quæ in humido sursum per rectam r l.] *Ex antecedenti positione. magnitudo enim, quæ in humido demersa est, tanta ui per lineam r l sursum fertur, quanta quæ extra humidum per lineam s l, deorsum: id quod ex propositione sexta huius libri constare potest. & quoniam feruntur per alias, atque alias lineas;*

neas; neutra alteri obsistit, quo minus moueatur; idq; continenter fiat, dum portio in rectum fuerit constituta: tunc enim utrarumque magnitudinum grauitatis centra in unam, eandemq; perpendicularum conueniunt, uidelicet in axem portionis: & quanto conatu, impetúue ea, quæ in humido est sursum, tanto quæ extra humidum deorsum per eandem lineam contendit. quare cum altera alteram non superet, non amplius mouebitur portio; sed consistet, manebitq; in eodem semper situ; nisi forte aliqua causſa extrinsecus accesserit.

PROPOSITIO IX.

QVOD si figura humido leuior in humidum demittatur, ita ut basis tota sit in humido; insidebit recta, ita ut axis ipsius secundum perpendicularem constituatur.

INTELLIGATVR enim magnitudo aliqua, qualis dicta est, in humidum demissa: & intelligatur planum per axem portionis, & per centrum terræ ductum: sitq; superficiei quidem humidi sectio a b c d circunferentia; figuræ autem sectio circunferentia e f h: & sit e h recta linea: & axis portionis f t. Si igitur fieri potest, non sit f t secundum perpendicularem.



Demonstrandum est non manere figuram; sed in rectum restitui. est autem centrum sphæræ in linea f t: rursus enim sit figura primo maior dimidia sphæra: & sphæræ centrũ in dimidia sphæra sit punctum t, in minore portione p; in maiori uero sit k: & per k, & terræ centrum l ducatur k l. Itaque figura quæ est A

extra humidi ſuperficiem, axem habet in perpendiculari per k: & propter ea, quæ ſuperius dicta ſunt, centrum grauitatis ipſius eſt in linea n k, quod ſit r; totius autem portionis centrum grauitatis eſt in linea f t, inter k & f, quod ſit x. reliquæ ergo figuræ, eius ſcilicet, quæ eſt in humido, centrum erit in recta linea r x producta ad partes x; & aſ-



ſumpta c x ea linea quadam, quæ ad x r eandem habeat proportionem, quam grauitas portionis, quæ eſt extra humidum, ad grauitatem figuræ, quæ in humido. Sit autem o centrum dictæ figuræ: & per o perpendicularis ducatur l o. Feretur ergo grauitas portionis quidem, quæ eſt extra humidum, per rectam r l deorſum; figuræ autem, quæ in humido, per rectam o l ſurſum. non manet igitur figura; ſed partes eius, quæ ſunt ad h, deorſum ferētur; & quæ ad e ſurſum. atque hoc ſemper erit, donec f t ſecundum perpendicularem fiat.

COMMENTARIVS.

A ITAQVE figura, quæ eſt extra humidi ſuperficiem, axem habet in perpendiculari per k.]

DVCATVR *enim b c, quæ ſecet lineam n k in m: ipſa uero n k circumferentiam a b c d ſecet in g. eodem modo, quo ſupra, demonſtra*

monſtrabimus portionis ſphæræ b n c axem eſſe ipſam n m: & portionis b g c axem g m. quare centrum grauitatis utriuſque, erit in linea n m. & quoniam à portione b n c auferetur portio b g c, non habens idem grauitatis centrũ: reliquæ magnitudinis, quæ eſt extra humidi ſuperficiem, centrum grauitatis erit in linea n k; quæ ſcilicet earum portionum centra grauitatis coniungit: ex eadem octaua Archimedis.



ARCHIMEDIS DE IIS QVAE VEHVNTVR IN AQVA

LIBER SECVNDVS.

CVM COMMENTARIIS FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS.

PROPOSITIO I.

I magnitudo aliqua humido leuior demittatur in humidum, eam in grauitate proportionem habebit ad humidum æqualis molis, quã pars magnitudinis demersa habet ad totam magnitudinem.

DEMITTATVR enim in humidum aliqua magnitudo solida, quæ sit fa, leuior humido: & pars quidem ipsius demersa sit a; quæ autem extra humidum f. demonstrandum est, magnitudinem f a ad humidum æqualis molis eam in grauitate proportionem habere, quam habet a ad f a. accipiatur enim aliqua humidi magnitudo n i æqualis



æqualis magnitudini f a; sitq, ipsi f æqualis n: & ipsi a æqualis i. magnitudinis autem f a grauitas sit b: & magnitudinis n i grauitas o r; & ipsius i sit r. magnitudo igitur f a ad n i eam proportionem habet, quam grauitas b ad grauitatem o r. Sed quoniam magnitudo f a in humidum demissa leuior est humido; patet tantam humidi molem, quanta est pars magnitudinis demersa, eandem quam magnitudo f a habere grauitatem. hoc enim superius demonstratum est. At ipsi a respondet humidum i, cuius quidem grauitas est r; & ipsius f a grauitas b. ergo b grauitas eius, quod habet molem æqualem toti magnitudini f a, æqualis erit grauitati humidi i, uidelicet ipsi r. Et quoniam ut magnitudo f a ad humidum n i sibi respondens, ita est b ad o r: est autem b æqualis ipsi r: & ut r ad o r, ita i ad n i; & a ad f a. Sequitur ut f a ad humidum æqualis molis eam in grauitate proportionem habeat, quam magnitudo a habet ad f a. quod demonstrare oportebat.

5. primi huius.

11. quinti

PROPOSITIO II.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando axem habuerit minorem, quam sesquialterum eius, quæ usque ad axem, quamcunque proportionem habens ad humidum in grauitate; demissa in humidum, ita ut basis ipsius humidum non contingat; & posita inclinata, non manebit inclinata; sed recta restituetur. Rectam dico consistere talem portionem, quando planum quod ipsam secuit, superficiei humidi fuerit æquidistans. A

SIT portio rectanguli conoidis, qualis dicta est; & ia-

ceat inclinata. Demonstrandum est non manere ipsam; sed rectam restitui. Itaque secta ipsa plano per axem, recto ad planum, quod est in superficie humidi, portionis sectio sit a p o l rectanguli coni sectio: axis portionis, & sectionis diameter n o: superficiei autem humidi sectio sit i s. Si igitur portio non est recta; non utique erit a l ipsi i s æquidistans. quare n o cum i s non faciet angulos rectos. ducatur ergo k ω contingens sectionem coni in p [quæ ipsi i s æquidistet: & à puncto p ad i s ducatur p f æquidistans ipsi o n, quæ erit sectionis i p o s diameter, & axis portionis in humido demersæ. sumantur deinde centra grauitatum: sitq; solidæ magnitudinis a p o l grauitatis centrũ r; ipsius uero i p o s centrum sit b: & iuncta b r producatur ad g, quod sit centrum grauitatis reliquæ figuræ i s l a. Quoniam igitur n o ipsius quidem r o sesquialtera est; eius autẽ, quæ usque ad axẽ minor, quam sesquialtera; erit r o minor, quàm quæ usque ad axem. Quare angulus r p ω acutus erit: cum enim linea, quæ usque ad axem maior sit ipsa r o; quæ à puncto r ad k ω perpendicularis ducitur, uidelicet r t, cũ linea f p extra sectionem conueniet: & propterea inter p & ω puncta cadat necesse est. Itaq; si per b g ducantur lineæ ipsi r t æquidistantes; angulos rectos cum superficie humidi continebunt: & quod in humido est sursum feretur secundum perpendicularem, quæ per b ducta est, ipsi r t æquidistans: quod uero est extra humidum secundum

Suppleta a Federico Cõm.

B

C

D

E

F



G

cundum eam, quæ per g, deorsum feretur; & non ita mane bit solidum a p o l: nam quod est ad a feretur sursum; & quod ad b deorsum, donec n o secundum perpendicularem constituatur.]

COMMENTARIVS.

DESIDERATVR propositionis huius demonstratio, quam nos etiam ad Archimedis figuram apposite restituimus, commentarijsque illustrauimus.

Recta portio conoidis rectanguli, quando axem habue A
rit minorem, quàm sesquialterum eius, quæ usque ad axẽ] *In translatione mendose legebatur. maiorem quàm sesquialterum: & ita legebatur in sequenti propositione. est autem recta portio conoidis, quæ plano ad axem recto abscinditur: eámque rectam tunc consistere dicimus, quando planum abscindens, uidelicet basis plani, superficiei humidi æquidistans fuerit.*

Quæ erit sectionis i p o s diameter, & axis portionis in B
humido demersæ] *ex 46 primi conicorum Apollonij: uel ex corollario 51 eiusdem.*

Sitque solidæ magnitudinis a p o l grauitatis centrum r, C
ipsius uero i p o s centrum sit b.] *Portionis enim conoidis rectanguli centrum grauitatis est in axe, quem ita diuidit, ut pars eius, quæ ad uerticem terminatur, reliquæ partis, quæ ad basim, sit dupla: quod nos in libro de centro grauitatis solidorum propositione 29 demonstrauimus. Cum igitur portionis a p o l centrum grauitatis sit r, erit o r dupla r n: & propterea n o ipsius o r sesquialtera. Eadem ratione b centrum grauitatis portionis i p o s est in axe p f, ita ut p b dupla sit b f.*

Et iuncta b r producatur ad g, quod sit centrum grauI D
tatis reliquæ figuræ i s l a] *Si enim linea b r in g producta, habeat g r ad r b proportionem eam, quam conoidis portio i p o s ad reliquam figuram, quæ ex humidi superficie extat: erit punctum g ipsius grauitatis centrum, ex octaua Archimedis.*

E Erit r o minor, quàm, quæ uſque ad axem] *Ex decima propoſitione quinti libri elementorum. Linea, quæ uſque ad axem apud Archimedem, eſt dimidia eius, iuxta quam poſſunt, quæ à ſectione ducuntur; ut ex quarta propoſitione libri de conoidibus, & ſphæroidibus apparet. cur uero ita appellata ſit, nos in commentarijs in eam editis tradidimus.*

F Quare angulus r p ω acutus erit] *producatur linea n o ad h, ut ſit r h æqualis ei, quæ uſque ad axem. ſi igitur à puncto h ducatur linea ad rectos angulos ipſi n h, conueniet cum f p extra ſectionem: ducta enim per o ipſi a l æquidiſtans, extra ſectionem cadit ex decima ſeptima primi libri conicorum. Itaque conueniat in u. & quoniam f p eſt æquidiſtans diametro; h u uero ad diametrum perpendicularis; & r h æqualis ei, quæ uſq; ad axẽ, linea à puncto r ad u ducta angulos rectos faciet cum ea, quæ ſectionem in puncto p contingit, hoc eſt cum k ω, ut mox demonſtrabitur. quare perpendicularis r t inter p & ω cadet; erítque r p ω angulus acutus.*



Sit rectanguli coni ſectio, ſeu parabole a b c, cuius diameter b d: atque ipſam contingat linea e f in puncto g: ſumatur autem in diametro b d linea h k æqualis ei, quæ uſque ad axem: & per g ducta g l, diametro æquidiſtante, à puncto k *ad rectos angulos ipſi b d ducatur k m, ſecans g l in m. Dico lineam ab h ad*

m pro

m productam perpendicularem esse ad ipsam e f, quam quidem secet in n.

DVCATVR *enim à puncto g linea g o ad rectos angulos ipsi e f, diametrum in o secans: & rursus ab eodem puncto ducatur g p ad diametrum perpendicularis: secet autem ipsa diameter productа lineâ e f in q. erit p b ipsi b q æqualis, ex trigesimaquinta primi conicorum: & g p proportionalis iter q p, p o quare quadratũ g p rectangulo o p q æquale erit: sed etiã æquale est rectangulo cõtento ipsa p b, & linea, iuxta quã possunt, quæ à sectione ad diametrũ ordinatim ducuntur, ex undecima primi conicorum. ergo quæ est proportio q p ad p b eadem est lineæ, iuxta quã possunt, quæ à sectione ducũtur ad ipsam p o: est autem q p dupla p b: cũ sint p b, b q æquales, ut dictum est. Linea igitur iuxta quam possunt, quæ à sectione ducuntur ipsius p o dupla erit: & propterea p o æqualis ei, quæ usque ad axem, uidelicet ipsi k h: sed est p g æqualis k m; & angulus o p g angulo h k m; quòd uterque rectus. quare & o g ipsi h m est æqualis: & angulus p o g angulo k h m. æquidistantes igitur sunt o g, h n:*



cor. 8. sexti.

17. sexti.

14. sexti.



32. primi

4. primi.

28

29, primi angulus b n f æqualis angulo o g f: quòd cum sit g o perpendicularis ad e f, & b n ad eandem perpendicularis erit. quod demonstrare oportebat.

G Et quod in humido est sursum feretur secundum perpendicularem, quæ per b ducta est ipsi r t æquidistans.] Cur hoc quidem sursum, illud uero deorsum per lineam perpendicularem feratur, diximus supra in octauam primi libri huius. quare neque in hac, neque in alijs, quæ sequuntur, eadem iterare necessarium existimauimus.

PROPOSITIO III.

RECTA portio conoidis rectanguli quando axem habuerit minorem, quam sesquialterum eius, quæ usque ad axem, quamcunque proportionem habens ad humidum in grauitate; demissa in humidum, ita ut basis ipsius tota sit in humido; & posita inclinata, non manebit inclinata, sed ita restituetur, ut axis ipsius secundum perpendicularem fiat.

DEMITTATVR enim aliqua portio in humidum, qualis dicta est: sitq; ipsius basis in humido: & secta ipsa plano per axé, recto ad superficiē humidi, sit sectio a p o l rectanguli coni sectio: axis portionis, & sectionis diameter p f: superficiei autem humidi sectio sit i s. Quòd si inclinata iaceat portio, non erit axis secundum perpendicularem. ergo p f cum i s angulos rectos non faciet. Itaque ducatur linea quædā k ω æquidistans ipsi i s; contingens q; sectionē a p o l in o: & solidæ quidē magnitudinis a p o l sit r grauitatis centrum: ipsius autem i p o s centrum sit b: iun-

b: iunctaq; b r producatur: & sit g centrum grauitatis reliquæ figuræ i s l a. similiter demonstrabitur angulum r o k acutũ esse: & perpendicularẽ ab r ad k ω ductam cadere inter k & o, quæ sit r t. si autem à punctis g b ducantur ipsi r t æquidistantes; pars quidem solidæ magnitudinis,



quæ in humido est, sursum feretur secundum perpendicularem per g ductam: quæ autem extra humidum secundũ perpendicularem per b deorsum feretur: & non manebit solidum a p o l sic habens in humido: sed quod quidem est ad a feretur sursum: quod autem ad l deorsum; donec p f fiat secundum perpendicularem.

PROPOSITIO IIII.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando fuerit humido leuior, & axem habuerit maiorẽ, qnàm sesquialterum eius, quæ usque ad axem: si in grauitate ad humidum æqualis molis non minorem proportionem habeat ea, quàm quadratũ, quod fit ab excessu, quo axis maior est, quàm sesquialter eius, quæ usque ad axẽ, habet ad quadratum, quod ab axe; demissa in humidum, ita

ut basis ipsius humidum non contingat; & posita inclinata, non manebit inclinata, sed recta restituetur.

SIT portio conoidis rectanguli, qualis dicta est: & demissa in humidum, si fieri potest, non sit recta; sed inclinata: secta autem ipsa plano per axem, recto ad superficiem humidi, portionis quidem sectio sit rectanguli coni sectio a p o l, axis portionis, & sectionis diameter n o; & superficiei humidi sectio sit i s. si igitur portio non est recta, nō faciet n o cum i s angulos æquales. Ducatur k ω contingens rectanguli coni sectionem in p; æquidistansq; ipsi i s: & à puncto p ipsi o n æquidistans ducatur p f. Itaque sumantur centra grauitatum: & solidi quidem a p o l centrum sit r; eius autem, quod intra humidum, centrum b: iunctaq; b r producatur ad g, ut g sit centrū grauitatis solidi, quod extra humidum. Quoniam igitur n o ipsius quidem r o sesquialtera ē; eius autē, quæ usque ad axē maior, quàm sesquialtera: patet r o maiorē esse, quàm quæ usq; ad axē. Sit ei, quæ usque ad axē æqualis r h: & o h dupla ipsius h m. quòd cū n o ipsius r o sesquialtera sit; itemq; m o ipsius o h: & reliqua n m reliquæ r h sesquialtera erit. ergo axis tanto maior est, quàm sesqui-



10. quinti

A

B

19. quinti

sesquialter eius, quæ usque ad axem, quanta est linea m o. Ponebatur autem portio ad humidum æqualis molis non minorem in grauitate proportionem habere, quàm quadratum, quod fit ab excessu, quo axis est maior, quam sesquialter eius, quæ usque ad axem, ad quadratum, quod ab axe. quare constat portionem ad humidum in grauitate non minorem proportionem habere, quàm quadratum lineæ m o ad quadratum ipsius n o. Sed quam proportionem habet portio ad humidum in grauitate, eandem portio ipsius demersa habet ad totam portionem: hoc enim C supra demonstratum est: & quam proportionem habet demersa portio ad totam, eam quadratum p f habet ad n o D quadratum: cum demonstratum sit in iis, quæ de conoidibus, & sphæroidibus, si à rectangulo conoide duæ portiones planis quomodocunque ductis abscindantur, portiones inter se eandem habere proportionem, qnàm quadrata, quæ ab ipsorum axibus constituuntur. non minorem ergo proportionē habet quadratum p f ad quadratū n o, quàm quadratum m o ad idem n o quadratum. quare E p f non est minor ipsa m o; nec b p item minor h o. Si F igitur ab h ducatur linea ad rectos angulos ipsi n o, coibit cum b p, atque inter b, & p cadet. coeat in t. & quo H niam p f quidem æquidistans est diametro, h t autem ad diametrum perpendicularis; & r h æqualis ei, quæ usque ad axem: ducta linea ab r ad t & producta angulos rectos faciet cum linea sectionem in puncto p contingente. quare & cum i s, & cum humidi superficie, quæ per i s transit. Itaque si per b g puncta lineæ ipsi r t æquidistantes ducantur, angulos rectos facient cum superficie humidi: & quod quidem in humido est solidum conoidis feretur sursum secundum eam, quæ per b ducta fuerit ipsi r t æquidistans: quod autem extra humidum, secundum eam, quæ per g deorsum feretur. atque hoc tandiu fiet, quoad conoides rectum constituatur.

A Sit ei, quæ usque ad axem æqualis r h.] *Ita legendum est, non r m, ut translatio habet, quod ex ijs, quæ sequuntur, manifeste constare potest.*

B Et o h dupla ipsius h m.] *In translatione mendose legebatur, o n dupla ipsius r m.*

C Hoc enim supra demonstratum est.] *In prima huius.*

D Et quam proportionem habet demersa portio ad totā, eam quadratum p f habet ad n o quadratum.] *Hoc loco in translatione non nulla desiderabantur, quæ nos restituimus. Illud autem ab Archimede demonstratum est in libro de conoidibus & sphæroidibus propositione 26.*

E Quare p f non est minor ipsa m o.] *Nam ex decima quinti sequitur, quadratum p f non esse minus quadrato m o. quare neque linea p f minor erit linea m o ex 22 sexti.*

F Nec b p item minor h o.] *Est enim ut p f ad p b, ita m o, ad h o: & permutando, ut p f ad m o, ita b p, ad h o. sed p f non* 14. quinti *est minor m o, ut ostensum est. ergo neque b p ipsa h o minor erit.*

G Si igitur ab h ducatur linea ad rectos angulos ip si n o, coibit cum b p, atque inter b & p cadet.] *Corruptus erat hic locus in translatione. Illud uero ita demonstrabitur. Quoniam p f non est minor o m, nec p b ipsa h o; si ponatur p f æqualis o m; & p b, ipsi h o æqualis erit,*



quare

quare per o ducta ipſi a l æquidiſtans cadet extra ſectionem ex 17. primi conicorum: & cum b p producta coibit infra p. ergo & perpendicularis ducta per h cum eadem infra b coibit, atque inter b & p neceſſario cadet. multo autem magis illud idem ſequetur, ſi ponamus p f ipſa o m maiorem eſſe.

Et quoniam p f quidem æquidiſtans eſt diametro, h t autem ad diametrum perpendicularis; & r h æqualis ei, quæ uſque ad axem, ducta linea ab r ad e, & producta angulos rectos facere cum linea ſectionem in p contingente. H] *Hoc ſuperius à nobis demonſtratum eſt in ſecundam huius.*

PROPOSITIO V.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando leuior humido axem habuerit maiorem, quàm ſeſquialterum eius, quæ uſque ad axem; ſi ad humidum in grauitate non maiorem proportionẽ habeat, quàm exceſſus, quo quadratum quod fit ab axe maius eſt quadrato, quod ab exceſſu, quo axis maior eſt, quàm ſeſquialter eius, quæ uſque ad axem, ad quadratum, quod ab axe: demiſſa in humidum, ita ut baſis ipſius tota ſit in humido; & poſita inclinata non manebit inclinata, ſed reſtituetur ita, ut axis ipſius ſecundum perpendicularem fiat.

DEMITTATVR enim in humidum portio aliqua, qualis deſcripta eſt: & ſit baſis ipſius tota in humido. Secta autem ipſa plano per axem, recto ad ſuperficiem humidi, erit ſectio rectanguli coni ſectio, quæ ſit a p o l: axis portionis,

& sectionis diameter n o: superficiei autem humidi sectio sit i s. Quoniam igitur axis non est secundum perpendicularem; ipsa n o cum i s non faciet angulos æquales. Ducatur k ω contingens sectionem a p o l in p; atque ipsi i s æquidistans: per p autem ducatur p f æquidistãs ipsi n o: & sumantur grauitatum centra: sitq; ipsius a p o l solidi centrum r; eius quod extra humidum sit b: & iuncta b r producatur ad g, quod sit centrum grauitatis solidi ī humido demersi: sumatur præterea r h æqualis ei, quæ usque ad axẽ: o h autem dupla ipsius h m; & alia fiãt, sicuti superius dictum est. Itaque cum portio ad humidum in grauitate non maiorem proportionem habere ponatur, quã excessus, quo quadratum n o excedit quadratum m o, ad ipsum n o quadratum: & quam proportionem in grauitate portio habet ad humidum æqualis molis, eandem habeat magnitudo portionis demersa ad totam portionem, quod demonstratum est in prima propositione:



11. quinti. magnitudo demersa non maiorem proportionem habebit ad totam portionem, quàm sit dicta illa proportio. quare non maiorem proportionem habet tota portio ad eam quæ est extra humidum, quàm quadratum n o ad quadratum m o. habet autem tota portio ad eam, quæ extra humidum proportionem eandem, quam quadratum

A

B

dratum n o ad quadratum p f. quadratum igitur n o ad quadratum p f non maiorem proportionem habet, quàm ad quadratum m o. ex quo efficitur, ut p f non sit minor ipsa o m; neque p b ipsa o h. quæ ergo ab h ducitur ad rectos angulos ipsi n o, coibit cum b p inter p & b. coeat in t. & quoniam in rectanguli coni sectione p f est æquidistans diametro n o; h t autem ad diametrum perpendicularis: & r h æqualis ei, quæ usque ad axem: constat r t productam facere angulos rectos cum ipsa k p ω. quare & cum i s. ergo r t perpendicularis est ad superficiem humidi. et si per b g puncta ducantur æquidistantes ipsi r t, ad superficiem humidi perpendiculares erunt. portio igitur, quæ est extra humidum, deorsum in humidum feretur secundum perpendicularem per b ductam; quæ uero intra humidum secundum perpendicularem per g sursum feretur: & non manebit solida portio a p o l, sed intra humidum mouebitur, donec utique ipsa n o secundum perpendicularem fiat.

COMMENTARIVS.

Quare non maiorem proportionem habet tota portio ad eam, quæ est extra humidum, quàm quadratum n o ad quadratum m o] *Cum enim magnitudo portionis in humidum demersa ad totam portionem non maiorem proportionem habeat, quàm excessus, quo quadratum n o excedit quadratum m o, ad ipsum n o quadratum: conuertendo per uigesimã sextam quinti elementorum ex traditione Campani, tota portio ad magnitudinem demersam non minorem proportionem habebit, quàm quadratum n o ad excessum, quo ipsum quadratum n o excedit quadratum m o. Intelligatur portio, quæ extra humidum, magnitudo prima: quæ in humido demersa est, secunda: tertia autem magnitudo sit quadratum m o: & excessus, quo quadratum n o excedit quadratum m o sit quarta. ex his igitur magnitudinibus, primæ & secundæ ad secum-*

dam non minor est proportio, quàm tertiæ & quartæ ad quartam; est enim quadratum m o unà cum excessu, quo quadratum n o excedit quadratum m o æquale ipsi n o quadrato. quare per conuersionem rationis ex 30 eiusdem, primæ & secundæ ad primam non maior proportio erit, quàm tertiæ & quartæ ad tertiam: & idcirco tota portio ad portionem eam, quæ est extra humidum non maiorem proportionem habebit, quàm quadratum n o ad quadratum m o, quod demonstrandum proponebatur.

B Habet autem tota portio ad eam, quæ extra humidum proportionem eandem, quam quadratum n o ad quadratum p f.] *Ex uigesimasexta libri de conoidibus, & sphæroidibus.*

C Ex quo efficitur, ut p f non sit minor ipsa o m; neque p b ipsa o h.] *Sequitur illud ex decima & decimaquarta quinti, & ex uigesimasecunda sexti elementorum, ut superius dictum est.*

D Quæ ergo ab h ducitur ad rectos angulos ipsi n o coibit cum p b inter p & b.] *Cur hoc ita contingat, nos proxime explicauimus.*

PROPOSITIO VI.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando leuior humido axem habuerit maiorem quidem quàm sesquialterum eius, quæ usque ad axem, minorem nero, quàm ut ad eam, quæ usque ad axem proportionem habeat, quam quindecim ad quatuor; in humidum demissa adeo, ut basis ipsius contingat humidum, nunquam consistet inclinata ita, ut basis in uno puncto humidum contingat.

Sit

SIT portio, qualis dicta est, & in humidum demittatur, sicuti diximus, adeo ut basis eius in uno puncto contingat humidum. demonstrandum est non manere ipsam portionem, sed reuolui ita, ut basis nullo modo humidi superficiē A
contingat. Secta enim ipsa per axem, plano ad superficiem humidi recto, sit sectio superficiei portionis a p o l rectāguli coni sectio: superficiei humidi sectio sit a s: axis autem portionis, ac sectionis diameter n o: & secetur in f quidē ita, ut o f sit dupla ipsius f n; in ω uero, ut n o ad f ω eandem habeat proportionem, quam quindecim ad quatuor: & ipsi n o ad rectos angulos ducatur ω k. Itaque quoniam n o B
ad f ω maiorem habet proportionem, quàm ad eam, quæ usque ad axem; sit ei, quæ usque ad axem æqualis f b: & ducatur p c quidem ipsi a s æquidistans, cōtingensq; sectionem a p o l in p; p i uero æquidistans ipsi n o: & primum secet p i ipsam k ω in h. Quoniā ergo in portione a p o l, C
quæ continetur recta linea, & rectanguli coni sectione, k ω quidem æquidistans est ipsi a l; p i uero diametro æquidistat: secaturq; ab ipsa k ω in h: & a s æquidistat contingenti in p: necessarium est ipsam p i ad p h uel eandem proportionem habere, quam habet n ω ad ω o, uel maiorem: hoc enim iam demonstratum est. At uero n ω sesquialtera A
est ipsius ω o. & p i igitur uel sesquialtera est ipsius h p; uel maior, quàm sesquialtera. Quare p h ipsius h i aut du D



pla est, aut minor, quàm dupla. Sit autem p t dupla t i. erit centrum grauitatis eius, quod est in humido, punctum t. Itaque iuncta t f producatur; sitq; eius, quod extra humidum grauitatis centrum g: & à puncto b ad rectos angulos ipsi n o ducatur b r. Quòd cum p i quidem sit æquidistans diametro n o: b r autem ad diametrum perpendicularis. & f b æqualis ei, quæ usque ad axem: perspicuum est f r productam æquales facere angulos cum ea, quæ sectionem a p o l in puncto p contingit. quare & cum à s: & cum superficie humidi. lineæ autem ductæ per t g æquidistantes ipsi f r, erunt & ad humidi superficiē perpendiculares: & solidi a p o l magnitudo, quæ ē intra humidum sursum feretur secundum perpendicularem per t ductam; quæ uerò extra humidum secundum eam, quæ per g deorsum feretur. reuoluetur ergo solidum a p o l: & basis ipsius nullo modo humidi superficiem continget. At si p i lineam k ω non secet, ut in secunda figura; manifestum est punctum t, quod est centrum grauitatis demersæ portionis, cadere inter p & i: & reliqua similiter demonstrabuntur.



E

COMMENTARIVS.

A Demonstrandum est non manere ipsam portionem, sed reuolui ita, ut basis nullo modo superficiem humidi contingat.] *Hæc nos addidimus tanquam ab interprete omissa.*

Itaque

Itaque quoniam n o ad f ω maiorem habet proportionem, quam ad eam, quæ usque ad axem.] *Habet enim diameter portionis n o ad f ω proportionem eandem, quam quindecim ad quatuor; ad eam uero, quæ usque ad axem minorem proportionem habere ponitur, quàm quindecim ad quatuor. quare n o ad f ω maiorem habebit proportionem, quàm ad eam, quæ usque ad axem: & propterea quæ usque ad axem ipsa f ω maior erit.* B

Quoniam ergo in portione a p o l, quæ continetur recta linea, & rectanguli coni sectione, k ω quidem æquidistans est ipsi a l; p i uero diametro æquidistat; secatur q; ab ipsa k ω in h: & a c æquidistat contingenti in p: necessarium est ipsam p i ad p h uel eandem proportionem habere, quam habet n ω ad ω o, uel maiorem. hoc enim iam demonstratum est] *Vbi hoc demonstratum sit uel ab ipso Archimede, uel ab alio, nondum apparet, quocirca nos demonstrationem afferemus, posteaquam non nulla, quæ ad eam pertinent explicauerimus.* 10. quinti

LEMMA I.

Sint lineæ a b, a c angulum b a c continentes: & à puncto d, quod in linea a c sumptum sit, ducantur d e, d f utcunque ad ipsam a b. Sumptis uero in eadem linea quotlibet punctis g l, ducantur g h, l m ipsi d e æquidistantes; & g k, l n æquidistantes f d. deinde à punctis d, g usque ad lineam m l ducantur, d o p quidem secans g h in o; & g q, quæ æquidistent ipsi b a. Dico lineas, quæ inter æquidistantes ipsi f d ad eas, quæ inter æquidistantes d e interiiciuntur, uidelicet k n ad g q, uel ad o p; f k ad d o; & f n ad d p eandem inter se proportionem habere: nempe eam, quam habet a f ad a e.

Quoniam enim triangula afd, akg, anl similia sunt; itemq; similia efd, hkg, mnl:
4. sexti. *erit ut af ad fd, ita ak ad kg; ut autem fd ad fe, ita kg ad kh. quare ex æquali ut af ad fe, ita ak ad kh: & per conuersionem rationis ut af ad ae, ita ak ad ah. eodem modo ostendetur, ut af ad ae, ita an ad am.*
19. quinti *cum igitur an ad am sit, ut ak ad ah; erit reliqua kn ad reliquam hm, hoc est ad gq, uel op, ut an ad am; hoc est ut af ad ae. rursus ak ad ah est, ut af ad ae. ergo reliqua fk ad eh reliquam, uidelicet ad do, ut af ad ae. Similiter demonstrabimus ita esse fn ad dp. quod quidem demonstrare oportebat.*



LEMMA II.

Sint in eadem linea a b puncta duo r s ita disposita, ut as ad ar eandem proportionem habeat, quam af ad ae: & per r ducatur rt ipsi ed æquidistans; per s uero ducatur st æquidistans fd, ita ut cum rt in t puncto conueniat. Dico punctum t cadere in lineam ac.



Si enim fieri potest, cadat citra: & producatur rt usque ad ipsam ac in u. deinde per u ducatur ux ipsi fd æquidistans. Itaque ex ijs, quæ proxime demonstrauimus ax ad ar

eam

eam proportionem habebit, quam a f ad a e. Sed & eandem habet a s ad a r. quare a s ipsi a x est æqualis, pars toti, quod fieri non potest. Idem absurdum sequetur, si ponamus punctum t cadere ultra lineam a c. necessarium igitur est, ut in ipsam a c cadat. quod demonstrandum proposuimus. 9. quinti

LEMMA III.

Sit parabole, cuius diameter a b: atque eam cõtingentes rectæ lineæ a c, b d; a c quidem in puncto c, b d uero in b: & per c ductis duabus lineis; quarum altera c e diametro æquidistet, altera c f æquidistet ipsi b d: sumatur quod uis punctum g in diametro: fiatq; ut f b, ad b g, ita b g ad b h: & per g h ducantur g k l, h e m, æquidistantes b d: per m uero ducatur m n o ipsi a c æquidistans, quæ diametrum secet in o: & per n ducta n p usque ad diametrum, ipsi b d æquidistet. Dico h o ipsius g b duplam esse.

VEL igitur linea m n o secat diametrum in g, uel in alijs punctis: & si quidem secat in g, unum atque idem punctum duabus literis g o notabitur. Itaque quoniam f c, p n, h e m sibi ipsis æquidistant: & ipsi a c æquidistat m n o: fient triangula a f c, o p n, o h m inter se similia. quare erit o h ad h m, ut a f ad f c: & permutando o h ad a f, ut h m ad f c. est autem quadratum h m ad quadratum g l, ut linea h b ad lineam b g, ex uigesima primi libri conicorum: & quadratum g l ad quadratum f c, ut linea g b ad ipsam b f: suntq; h b, b g, b f lineæ deinceps proportionales. ergo & quadrata h m, g l, f c, & ipsorum latera proportionalia erunt. atque idcirco ut quadratum h m ad quadratum g l, ita li- 4. sexti. 22. sexti. cor. 20. sexti.

nea h m ad lineam f c. at uero ut h m ad f c, ita o h ad a f: & ut quadratum h m ad quadratū g l, ita linea h b ad b g; hoc est b g ad b f. ex quibus sequitur o h ad a f ita esse, ut b g ad b f: & permutando o h ad b g, ut a f ad f b. sed est a f dupla ipsius f b: sunt enī a b, b f æquales ex 35 primi libri conicorum. ergo & h o ipsius g b est dupla. quod demonstrare oportebat.



LEMMA IIII.

Iisdem manentibus, & à puncto m ducta m q usque ad diametrum, quæ sectionem in puncto m contingat; Dico h q ad q o eandem proportionem habere, quam habet g h ad c n.

FIAT enim h r æqualis g f. & cum triangula a f c, o p n similia sint, & p n sit æqualis f c; eodem modo demonstrabimus p o, f a inter se æquales esse. quare p o ipsius f b dupla erit. Sed est h o dupla g b. ergo & reliqua p h reliquæ f g; uidelicet ipsius r h est dupla

pla. ex quo fit ut p r, r h, f g inter se sint æquales; itémq; æquales r g, p f. est enim p g utrique r p, g f communis. Quoniam igitur h b ad b g est, ut g b ad b f; per cõuersionem rationis erit b h ad h g, ut b g ad g f. est autem q h ad h b, ut h o ad g b. nam ex 35 primi libri conicorum, cum linea q m cõtingat sectionem in puncto m; erũt h b, b q æquales; & g h ipsius h b dupla. ergo ex æquali q h ad h g, ut h o ad g f; hoc est ad h r: & permutando q h ad h o, ut g h ad h r.



rursus per conuersionem rationis h q ad q o, ut h g ad g r; hoc est p f: & propterea ad ipsam c n, quod demonstrandum fuerat.

His igitur explicatis, iam ad id, quod propositum fuerat, accedamus. Itaque dico primum n c ad c k eandem proportionem habere, quam h g ad g b.

Quoniam enim h q ad q o est, ut h g ad c n, hoc est ad a o ipsi c n æqualem; erit reliqua g q ad reliquam q a, ut h q ad q o: & ob eam causam lineæ a c g l productæ ex ijs, quæ supra demonstrauimus in linea q m conueniunt. Rursus g q ad q a est, ut h q ad

2. lem: 4. lem. q o; uidelicet ut h g ad f p: quod proxime demonstratum est. At uero ipsi g q æquales sunt duæ lineæ simul sumptæ q b, hoc est h b, & b g: atque ipsi q a æqualis est h f. Si enim ab æqualibus h b, h q, æqualia f b, b a demantur, remanentia æqualia erunt. ergo dempta h g ex duabus lineis h b, b g, relinquitur dupla ipsius b g; hoc est o h: & dempta p f ex f h, reliqua est h p. quare o h ad h p, est ut g q ad q a. Sed ut g q ad q a, ita h q ad q o; hoc est h g ad n c: & ut o h ad h p, ita g b ad c k. est enim o h dupla g b, & h p item dupla g f; hoc est c k. eandem igitur proportionem habet h g ad n c, quam g b ad c k: & permutando n c ad c k eandem habet, quam h g ad g b.

19. quinti

15. quinti.



Sumatur deinde aliud quod uis punctum in sectione, quod sit s: & per s duæ lineæ ducantur: s t quidem æquidistans ipsi d b, diametrum q in puncto t secans; s u uero æquidistans a c, & secans c e in u. Dico u c ad c k maiorem proportionem habere, quam t g ad g b.

Produ

Producatur enim u s ad lineam q m in x: & à puncto x ducatur ad diametrum x y ipsi b d æquidistans. erit g t minor quàm g y, quoniam u s minor est quàm u x: & ex primo lemmate y g ad u c erit, ut h g ad n c; uidelicet ut g b ad c k, quod proxime demonstrauimus: & permutando y g ad g b, ut u c ad c K. Sed t g cum sit ipsa y g minor, habet ad g b proportionem minorem, quàm y g ad eandem. ergo u c ad c K maiorem proportionẽ habet, quàm t g ad g b. quod demonstrasse oportuit. Itaque positione data g K unum duntaxat erit in sectione punctum, uidelicet m, à quo ductis duabus lineis m e h, m n o, habeat n c ad c K proportionem eandem, quam h g ad g b. nam si ab alijs omnibus ducantur, semper ea, quæ inter a c, & lineam ipsi æquidistantem interijcitur, ad c K proportionem maiorem habebit, quàm quæ inter g K atque ei æquidistantem, ad ipsam g b. Constat igitur id, quod ab Archimede dictum est; nempe lineam p i ad p h uel eandem, quam n ω ad ω o, uel maiorem habere proportionem.

Quare p h ipsius h i aut dupla est, aut minor quàm dupla.] *Si quidẽ minor, quàm dupla, sit p t dupla t i. erit centrum grauitatis eius, quod in humido est, punctum t. si uero p h sit ipsius h i dupla, erit h grauitatis centrum: ductâq; h f, & producta ad centrum eius, quod est extra humidum, uidelicet ad g, alia similiter demonstrabuntur. atque idem intelligendum est in propositione, quæ sequitur.* D



Re uoluetur ergo solidum a p o l, & basis ipsius nullo E

F

modo humidi superficiem continget.] *In translatione legebatur ut basis ipsius non tangat superficiem humidi secundum unum signum. nos autem ita uertere maluimus, & hic & in ijs, quæ sequuntur, quoniam græci* οὐδὲ εἷς, οὐδὲ ἕν, *pro* οὐδείς, *&* οὐδέν *frequenter utuntur. ut* οὐδὲ ἔστιν οὐδείς, *nullus est:* οὐδ' ὑφ' ἑνός, *à nullo & alia eiusmodi.*

PROPOSITIO VII.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando leuior humido axem habuerit maiorem quidem quàm sesquialterum eius, quæ usque ad axem; minorem uero, quàm ut ad eam, quæ usque ad axem proportionem habeat, quam quindecim ad quatuor: in humidum demissa, adeo ut basis ipsius tota sit in humido; nunquam consistet ita, ut basis contingat humidi superficiem: sed ut tota in humido sit, & nullo modo eius superficiem contingat.

SIT portio qualis dicta est: & demittatur in humidũ, ut diximus, adeo ut basis ipsius in uno puncto contingat humidi superficiem. Demonstrandum est non manere ipsam: sed reuolui ita ut basis superficiem humidi nullo modo contingat. Secta enim ipsa plano per axem, recto ad superficiem humidi, sectio sit a p o l rectanguli coni sectio: superficiei humidi sectio sit s l: axis portionis, & sectionis diameter p f: secetur q; p f in r quidem ita ut r p sit dupla ipsius r f; in ω autem ut p f ad r ω proportionem habeat, quam quindecim ad quatuor: & ω k ipsi p f ad rectos angulos ducatur erit r ω minor, quàm quæ usque ad axem. Itaque accipiatur ei, quæ usque ad axem æqualis r h:

&c o

& c o quidē ducatur contingēs sectionē in o, quæ ipsi s l æquidistet; n o autem æquidistet p f. & primum ipsam k ω secet, atque in pūcto i similiter ut in superioribus demonstrabitur n o, uel sesquialtera ipsius o i, uel maior, quàm sesquialtera. Sit autem o i minor, quàm dupla ipsius i n: sitq; o b dupla b n: & disponantur eadem, quæ supra. Similiter demonstrabimus, si ducatur linea r t, facere eam angulos rectos cum linea c o, & cum superficie humidi. quare à punctis b g lineæ ductæ ipsi r t æquidistātes, etiā ad humidi superficiē perpēdiculares erunt. portio igitur quæ est extra humidū deorsum feretur secundum eam perpendicularem, quæ per b transit; quæ uero intra humidum secundum eam, quæ per g sursum feretur. ex quibus constat reuolui solidum, ita ut basis ipsius nullo modo humidi superficiem contingat: quoniam nunc in uno puncto contingens deorsum fer-





tur ex parte l. Quod si no non secuerit ipsam ω k, eadem nihilominus demonstrabuntur.

PROPOSITIO VIII.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando axem habuerit maiorem quidem, quàm sesquialterum eius, quæ usque ad axem; minorem uero, quàm ut ad eam, quæ usque ad axem proportionem habeat, quam quindecim ad quatuor: si in grauitate ad humidum habeat proportionem minorem ea, quam quadratum, quod fit ab excessu, quo axis maior est, quàm sesquialter eius, quæ usque ad axem, habet ad quadratum, quod ab axe: demissa in humidum, ita ut basis ipsius humidum non contingat; neque in rectum restituetur, neque manebit inclinata, nisi quando axis cum superficie humidi angulum fecerit æqualē ei, de quo infra dicetur.

SIT portio qualis dicta est; sitque b d æqualis axi: & b κ quidem dupla ipsius κ d: r κ uero æqualis ei, quæ usque ad axem: & sit c b sesquialtera b r. erit & c d ipsius
A κr sesquialtera. Quam uero portionem habet portio ad humidum in grauitate, habeat quadratum f q ad quadratum d b: & sit f dupla ipsius q. perspicuum igitur est f q ad d b proportionem minorem habere ea, quam habet c b ad b d. est enim c b excessus, quo axis maior est, quàm
B sesquialter eius, quæ usque ad axem: quare f q minor est ipsa

ipſa b c: & idcirco f minor ipſa b r. ſit ipſi f æqualis r ⊥: C
ducaturq; ad b d perpendicularis ⊥ e, quæ poſsit dimidiũ
eius, quod lineis k r, ⊥ b continetur: & iungatur b c. De-
monſtrandum eſt portionem in humidum demiſſam, ſicu-
ti dictum eſt, conſiſtere inclinatam ita, ut axis cum ſuperfi-
cie humidi angulum faciat angulo e b ⊥ æqualem. demit-
tatur enim aliqua portio in humidum, ut baſis ipſius hu-
midi ſuperficiem non contingat: & ſi fieri poteſt, axis cum
ſuperficie humidi non faciat angulum æqualem angulo
e b ⊥; ſed primo maiorem. ſecta autẽ portione plano per
axem, recto ad ſu-
perficiem humi-
di, ſit ſectio a p o l
rectanguli coni ſe
ctio: ſuperficiei
humidi ſectio x s:
ſitq; axis portio-
nis, & ſectiõis dia
meter n o: & du-
catur p y quidem
ipſi x s æquidi-
ſtans, quæ ſectio-
nem a p o l contin
gat in p: p m ue-
ro æquidiſtans ip-
ſi n o: & p i ad



n o perpendicularis. ſit præterea b r æqualis o ω. itemq; D
r k ipſi t ω: & ω h perpendicularis ad axem. Itaque quo-
niam ponitur axis portionis cum ſuperficie humidi facere
angulum maiorem angulo b: erit angulus p y i angulo b E
maior. maiorem ergo proportionem habet quadratum
p i ad quadratum y i, quam quadratum e ⊥ ad ⊥ b qua- F
dratum. Sed quam proportionem habet quadratum p i
ad quadratum i y, eandem linea k r habet ad lineam i y:

G & quam proportionem habet quadratum e ↓ ad quadratum ↓ b, eandem habet dimidium lineæ k r ad lineã ↓ b.
13. quinti. quare maiorem habet proportionem k r ad i y, quàm dimidium k r ad ↓ b: & idcirco i y minor est, quàm dupla
H ↓ b. est autem ipsius o i dupla. ergo o i minor est, quàm
K ↓ b: & i ω maior, quàm ↓ r. sed ↓ r est æqualis ipsi f. maior igitur est i ω, quàm f. & quoniam portio ad humidum in grauitate eam ponitur habere proportionem, quam quadratum f q ad quadratum b d: quam uero proportionem habet portio ad humidum in grauitate, eam habet pars ipsius demersa ad totam portionem: & quam pars ipsius demersa habet ad totam, eandem habet quadratum p m ad quadratum o n: sequitur quadratum p m ad quadratum o n eam proportionem habere, quam quadratum f q ad b d quadratum.

L atque ideo f q æqualis est ipsi p m.

M demõstrata est autem p h maior, quàm f. cõstat igitur p m minorem esse, quàm sesquialterã ipsius p h: & idcirco p h maiorem, quàm duplam h m. Sit p z ipsius z m dupla. erit t quidem cẽtrũ grauitatis totius solidi: centrũ eius partis, quæ intra humidum, punctum z: reliquæ uero



N partis centrum erit in linea z t producta usque ad g. Eodẽ modo demonstrabitur linea t h perpendicularis ad superficiem humidi. & portio demersa in humido feretur extra

humidum

humidum ſecundum perpendicularem, quæ per z ad humidi ſuperficiem ducta fuerit: quæ autem eſt extra humidum ſecundum eam, quæ per g intra humidum feretur. nõ ergo manebit portio ſic inclinata, ut ponitur: ſed neque reſtituetur recta: quoniam perpendicularium per z g ductarum, quæ quidem per z ducitur ad eas partes cadit, in quibus eſt l; & quæ per g ad eas, in quibus eſt a. quare ſequitur centrum z ſurſum ferri: & g deorſum. ergo partes totius ſolidi, quæ ſunt ad a deorſum, quæ uero ad l ſurſum ferentur. Rurſus alia eadem ponantur: axis autem portionis cum ſuperficie humidi angulum faciat minorẽ eo, qui eſt ad b. minorem igitur proportionem habet quadratum p i ad quadratum i y, quàm quadratum e ↓ ad ↓ b quadratum: quare k r ad i y minorem proportionẽ habet, quàm dimidium k r ad ↓ b: & propterea i y maior eſt, quam dupla ↓ b. eſt autem ipſius o i dupla. ergo o i ipſa ↓ b maior erit. ſed tota o ω eſt æqualis ipſi r b: & reliqua ω i minor quàm ↓ r. quare & p h minor erit, quàm f. Quòd cum m p ipſi f q ſit æqualis, cõſtat p m maiorẽ eſſe, quàm ſeſquialterã ipſius p h: & p h minorem, quam duplam h m. Sit p z ipſius z m dupla. Rurſus totius quidem ſolidi centrum grauitatis erit pũctum t; eius uero partis, quæ intra humidum z: & iuncta z t inueniа-



tur centrum grauitatis eius, quæ extra humidum in pro-
P tracta, quod sit g. Itaque per z g ductis perpendicularibus ad humidi superficiem, quæ ipsi t h æquidistent, sequitur portionem ipsam non manere, sed reuolui adeo, ut axis cum superficie humidi angulum faciat maiorē eo, quem nunc facit.



Et quoniam cū antea posuissem° facere angulū maiorem angulo b, portio neque tūc cōsistebat; perspicuū est ipsam consistere, si angulum fecerit angulo b
Q æqualem. Sic enim erit i o æqualis ∠ b: itemq; ω i æqualis ∠ r: & p h ipsi f. erit igitur m p sesquialtera p h; & p h dupla h m. quare cum h sit centrum grauitatis eius partis, quæ est in humido, per eandem perpendicularem, & ipsa sursum, & quæ extra est feretur deorsum. manebit igitur portio; quoniam altera pars ab altera non repelletur.

COMMENTARIVS.

A ET sit c b sesquialtera b r. erit & c d ipsius k r sesquialtera.] *In translatione ita legebatur. sit autem & c b quidem hemiolia ipsius b r: c d autem ipsius K r. Sed nos quod postremo loco legitur, idcirco corrigendum duximus, quoniam illud non ponitur ita esse, sed ex ijs, quæ posita sunt, necessario colligitur. si enim*

b ⊥ dupla sit ⊥ d, erit d b ipsius b ⊥ sesquialtera. & quoniam e b sesquialtera est b r, sequitur reliquam c d ipsius ⊥ r, hoc est eius, quæ usque ad axem sesquialteram esse. quare b c erit excessus, quo axis maior est, quàm sesquialter eius, quæ usque ad axem. 12. quinti

Quare f q minor est ipsa b c.] *Nam cum portio ad humidum in granitate proportionem habeat eandem, quàm quadratum f q ad quadratum d b: habeatq; minorem proportionem, quàm quadratum factum ab excessu, quo axis maior est, quàm sesquialter eius, quæ usque ad axem, ad quadratum ab axe; hoc est minorem, quàm quadratum c b ad quadratum b d: ponitur enim linea b d æqualis axi: quadratum f q ad quadratum d b proportionem minorem habebit, quàm quadratum c b ad idem b d quadratum. ergo quadratum f q minus erit quadrato c b: & propterea linea f q ipsa b c minor.* B 8. quinti.

Et idcirco f minor ipsa b r.] *Quoniam enim c b sesquialtera est b r, & f q ipsius f sesquialtera: estq; f q minor b c; & f ipsa b r minor erit.* C 14. quinti.

Itaque quoniam ponitur axis portionis cum superficie humidi facere angulum maiorem angulo b: erit angulus p y i angulo b maior.] *Nam cum linea p y superficiei humidi æquidistet; uidelicet ipsi x s: angulus p y i æqualis erit angulo, qui diametro portionis n o, & linea x s continetur. quare & angulo b maior erit.* D 29. primi

Maiorem igitur proportionem habet quadratum p i ad quadratum i y, quàm quadratum e ⊥ ad ⊥ b quadratũ.] *Describantur seorsum triangula p i y, e ⊥ b. & cum angulus p y i maior sit angulo e b ⊥, ad lineam i y, atque ad punctum ỹ in ea datum fiat angulus u y i æqualis angulo e b ⊥. est autem angulus ad i rectus æqualis recto ad ⊥. reliquus igitur y u i reliquo b c ⊥ est æqualis. quare linea u i ad lineam i y eandem proportionem habet, quam linea e ⊥ ad ⊥ b. Sed linea p i, quæ maior est ipsa u i ad lineam i n maiorem habet proportionem quam u i ad eandem. ergo p i ad i y maiorem proportionem habebit, quàm e ⊥ ad ⊥ b: & propterea quadratum p i ad quadratum i y maiorem habebit, quàm* E 4. sexti. 8. quinti. 13. quinti. H I K L M

quadratum e ↓ ad quadratum ↓ b.

F Sed quam proportionem habet quadratum p i ad quadratum i y, eandem linea k r habet ad lineam i y.] *Est enim ex undecima primi conicorum quadratum p i æquale rectangulo contento linea i o, & ea, iuxta quam possunt quæ à sectione ad diametrum ducuntur, uidelicet dupla ipsius k r. atque est i y dupla i o, ex trigesimatertia eiusdem: quare ex decimasexta sexti elementorum, rectangulum, quod fit ex k r, & i y æquale est rectangulo contento linea i o & ea, iuxta quam possunt: hoc est quadrato p i. Sed ut rectangulum ex k r, & i y ad quadratum i y, ita linea k r ad ipsam i y. ergo linea k r ad i y eandem proportionem habebit, quam rectangulum ex k r & i y, hoc est quadratum p i ad quadratum i y.*



Iem. 22. decimi.

G Et quam proportionem habet quadratũ e ↓ ad quadratum ↓ b, eandem habet dimidium lineæ K r ad lineã ↓ b.] *Nam cum quadratum e ↓ positum sit æquale dimidio rectanguli contenti linea k r, & ↓ b; hoc est ei, quod dimidia ipsius k r & linea ↓ b continetur: & ut rectangulum ex dimidia k r, & ↓ b ad quadratum ↓ b, ita sit dimidia k r ad lineam ↓ b: habebit dimidia k r ad ↓ b proportionem eandem, quam quadratum e ↓ ad quadratum ↓ b.*

Iem. 22. decimi

H Et idcirco i y minor est, quàm dupla ↓ b.] *Quam enim proportionem habet dimidium k r ad ↓ b, habeat k r ad aliam lineam. erit ea maior, quàm i y; nempe ad quam k r minorem proportionẽ habet: atque erit dupla ↓ b. ergo i y minor est, quam dupla ↓ b.*

20. quinti

K Et i ω maior, quam ↓ r.] *Cum enim a ω posita sit æqualis b r si ex b r demantur ↓ b, & ex o ω demantur o i, quæ minor est ↓ b: erit reliqua i ω maior reliqua ↓ r.*

L Atque ideo fq æqualis est ipsi p m.] *Ex decimaquarta quinti elementorum, nam linea o n ipsi b d est æqualis.*

M Demonstrata est autem p h maior, quàm f.] *Etenim demonstrata est i ω maior, quàm f; atque est p h æqualis ipsi i ω.*

N Eodem modo demonstrabitur t h perpendicularis ad humidi

humidi ſuperficiem.] *Eſt enim t ω æqualis κ r, hoc eſt ei, quæ uſque ad axem. quare ex ijs, quæ ſuperius demonſtrata ſunt, linea t h ducta erit ad humidi ſuperficiem perpendicularis.*

Minorem igitur proportionem habet quadratum p i O
ad quadratum i y, quàm quadratum e ⊥ ad ⊥ b quadratũ]
Hæc & alia, quæ ſequuntur, tum in hac, tum in ſequenti propoſitione non alio, quàm quo ſupra modo demonſtrabimus.

Itaque per z g ductis perpendicularibus ad humidi ſu- P
perficiem, quæ ipſi t h æquidiſtent; ſequitur portionem ip
ſam non manere, ſed reuolui adeo, ut axis cum ſuperficie
humidi angulum faciat maiorem eo, quem nunc facit.]
Nam cum perpendicularis, quæ per g, ducitur ad eas partes cadat, in quibus eſt l; quæ autem per z ad eas in quibus a: neceſſarium eſt centrum g deorſum ferri, & z ſurſum. quare partes ſolidi, quæ ſunt ad l deorſum; quæ uero ad a ſurſum ferentur, ut axis cum ſuperficie humidi maiorem angulum contineat.

Sic enim erit i o æqualis ⊥ b, itēq; ω i æqualis ⊥ r, & p h Q
ipſi f.] *Hoc in tertia figura, quam nos addidimus, perſpicue apparet.*

PROPOSITIO IX.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando axem habuerit maiorem quidem, quàm ſeſquialterum eius, quæ uſque ad axem; minorem uero, quàm ut ad eam, quæ uſque ad axem proportionem habeat, quam quindecim ad quatuor; & in grauitate ad humidum proportionem habeat maiorem, quàm exceſſus, quo quadratum, quod fit ab axe maius eſt quadrato, quod ab exceſſu, quo axis eſt maior, quàm ſeſquialter eius, quæ uſq; ad axem, habet ad quadratum, quod ab axe: in hu-

UNIVERSIDAD DE MURCIA

midum demissa adeo, ut basis ipsius tota sit in humido, & posita inclinata, nec conuertetur ita, ut axis ipsius secũdum perpendicularem sit, nec manebit inclinata, nisi quãdo axis cum superficie humidi angulum fecerit æqualem angulo similiter ut prius, assumpto.

SIT portio, qualis dicta est: ponaturq; d b æqualis axi portionis: & b k quidem sit dupla ipsius k d; k r autem æqualis ei, quæ usque ad axem: & c b sesquialtera b r. Quam uero proportionem habet portio ad humidum in grauitate, eam habeat excessus, quo quadratum b d excedit quadratum f q, ad ipsum b d quadratum: & sit f ipsius q dupla. constat igitur excessum, quo quadratum b d excedit quadratum b c ad quadratum b d, minorem habere proportionem, quam excessus, quo quadratũ b d excedit quadratum f q ad b d quadratum. est enim b c excessus quo axis portiõis maior est, quã sesquialter eius, quæ usque ad axem.



A quare quadratum b d magis excedit quadratum f q, quàm b c quadratum: & idcirco linea f q minor est, quàm b c: itemq; f minor, quàm b r. Sit ipsi f æqua

æqualis r ⊥ : & ducatur ⊥ r perpendicularis ad b d, quæ posſit dimidium eius, quod ipſis k r, ⊥ b, continetur. Dico portionem in humidum demiſſam adeo, ut baſis ipſius tota ſit in humido, ita conſiſtere, ut axis cum ſuperficie humidi faciat angulum angulo b æqualem. Demittatur enim portio in humidum, ſicuti dictum eſt; & axis cum humidi ſuperficie non faciat angulum æqualē ipſi b, ſed primo maiorem: ſecta autem ipſa plano per axem, recto ad ſuperficiem humidi, ſectio portionis ſit a p o l rectanguli coni ſectio; ſuperficiei humidi ſectio c i; ſitq; axis portionis, & ſectionis diameter n o, quæ ſecetur in punctis x t, ut prius: & ducantur y p quidem ipſi c i æquidiſtans, contingensq; ſectionem in p; m p uero æquidiſtans n o: & p s ad axem perpendicularis. Quoniam igitur axis portionis cum ſuperficie humidi facit angulum maiorem angulo b; erit & angulus s y p angulo b maior. quare quadratum p s ad quadratum s y maiorem habet proportionem, quàm quadratum ⊥ e ad quadratum ⊥ b: & propterea k r ad s y maiorem habet, quàm dimidium ipſius k r ad ⊥ b. ergo s y minor eſt, quam dupla ⊥ b; & s o minor, quàm ⊥ b. quare s x maior, quàm r ⊥; & p h maior, quàm f. Itaque quoniā portio ad humidum in grauitate eam habet proportionē, quam exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratum f q ad quadratum b d: quam uero proportionem habet portio ad humidum in grauitate, eandem pars ipſius demerſa habet ad totam portionē: ſequitur partē demerſam ad totam portionem, eam proportionem habere, quā exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratū f q, ad quadratū b d, habebit ergo tota portio ad eam, quæ eſt extra humidum proportionem eandem, quam quadratum b d ad quadratum f q. Sed quam proportionem habet tota portio ad eā, quæ eſt extra humidum, eandem habet quadratum n o ad quadratum p m. ergo p m ipſi f q æqualis erit. demonſtrata eſt autem p h maior, quàm f: quare m h minor erit,

B C D E

quàm q; & p h maior, quàm dupla h m. Sit igitur p z dupla ipsius z m: & iuncta z t producatur ad g. erit totius quidem portionis grauitatis centrũ t: eius, quæ est extra humidũ z: reliquæ uero partis, quæ in humido, centrum erit in linea z t producta; quod sit g. demõstrabitur similiter, ut prius, t h perpẽdicularis ad superficiem humidi: & quæ per z, g ducuntur æquidistantes ipsi t h, ad eandem perpẽdiculares. ergo portio, quæ est extra humidũ deorsum feretur secundum eam quæ per z transit; quæ uero intra secun-





dum

dum eam, quæ per g ſurſum eleuabitur. non igitur manebit portio ſic inclinata, nec conuertetur ita, ut axis ad ſuperficiem humidi ſit perpendicularis: quoniam quæ ex parte l F deorſum; quæ uero ex parte a ſurſum ferentur, ut ex iam demonſtratis apparere poteſt. Quòd ſi axis cum ſuperficie humidi fecerit angulum minorem angulo b, ſimiliter de- G monſtrabitur, nõ manere portionem, ſed inclinari, donec utique axis cum ſuperficie humidi faciat angulum angulo b æqualem.

COMMENTARIVS.

QVARE quadratum b d magis excedit quadratum A f q, quàm b c quadratum: & idcirco linea f q minor eſt, quàm b c: itemq; f minor quam b r.] *Quoniam exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratum b c ad quadratum b d minorem proportionem habet, quàm exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratum f q, ad idem quadratum: erit ex octaua quinti exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratum b c, minor quàm exceſſus, quo excedit quadratum f q. ergo quadratum f q minus eſt quadrato b c: & propterea linea f q minor linea b c. Sed f q ad f eandem proportionẽ habet, quam b c ad b r; utraque enim utriuſque ſeſqualtera eſt. cum* 14. quinti *igitur f q ſit minor b c, & f ipſa b r minor erit.*

Et propterea κ r ad ſy maiorem habet, quàm dimidium B ipſius κ r ad ↓ b.] *Eſt enim κ r ad ſy, ut quadratum p s ad quadratum ſy: & dimidium lineæ K r ad lineam ↓ b, ut quadratum e ↓ ad quadratum ↓ b.*

Et s o minor quàm ↓ b] *Eſt enim ſy dupla ipſius ſo.* C

Et p h maior, quàm f.] *Nam p h eſt æqualis ſω, & r ↓* D *ipſi f.*

Habebit ergo tota portio ad eam, quæ eſt extra humi- E dum proportionem eandem, quam quadratum b d ad quadratum r q.] *Cum pars demerſa ad totam portionem ita ſit, ut exceſſus, quo quadratum b d excedit quadratum f q ad b d quadratũ*

erit conuertendo tota portio ad partem ipsius demersam, ut quadratum b d ad excessum, quo quadratum f q excedit. quare per conuersionem rationis tota portio ad eam, quæ extra humidum est ut quadratum b d ad quadratum f q: nam quadratum b d tanto maius est excessu, quo excedit quadratum f q, quantum est ipsum f q quadratum.

F Quoniam quæ ex parte l deorsum, quæ uero ex parte a sursum ferentur.] *Hæc nos ita correximus, nam in translatione mendose, ut opinor, legebatur, quoniam quæ ex parte l ad superiora ferentur, perpendicularis enim quæ transit per z ad partes l, & quæ per g ad partes a cadit. quare centrum z unà cum partibus ijs, quæ sunt ad l deorsum feretur, centrum uero g unà cum partibus quæ ad a sursum.*

G Similiter demonstrabitur non manere portionem, sed inclinari, donec utique axis cum superficie humidi faciat angulum angulo b æqualem.] *Illud uero tum ex ijs, quæ in antecedenti dicta sunt, tum ex figuris, quas apposuimus, facile demonstrari potest.*

PROPOSITIO X.

RECTA portio conoidis rectanguli, quando leuior humido axem habuerit maiorem, quàm ut ad eam, quæ usque ad axem proportionem habeat, quam quindecim ad quatuor: in humidum demissa, ita ut basis ipsius non contingat humidum: non nunquam quidem recta consistet; non
A B nunquam inclinata: & interdum adeo inclinata, ut basis ipsius in uno puncto contingat superficiem humidi: idq; in duabus dispositionibus:

interdum

interdū quidem ita, ut basis in humidum magis demergatur: interdum uero ita, ut superficiem humidi nullo modo contingat; secundum proportionem, quam habet ad humidum in grauitate. Eorum quæ dicta sunt, singula inferius demonstrabuntur. C D E

SIT portio qualis dicta est: & secta ipsa plano per axē, recto ad superficiem humidi, sectio sit a p o l rectanguli coni sectio: axis portionis, & sectionis diameter b d: secetur q; b d in puncto quidem k ita, ut b k dupla sit ipsius k d: in c uero ita, ut b d ad κ c proportionē habeat eandem, quam quindecim ad quatuor. constat igitur k c maiorem esse, quàm quæ usque ad axem. Sit ei quæ usque ad axem æqualis κ r: & ipsius κ r sesquialtera d s. Est autem & s b sesquialtera ipsius b r. Itaque iūgatur a b; & per c ducatur c e perpēdicularis ad b d, quæ lineā a b in puncto e secet: & per e ducatur e z æquidistās b d. Rursus ipsa a b bifariā in t diuisa, ducatur t h eidem b d æquidistans: & intelligantur rectanguli coni sectiones descriptæ a e i qui- F G H



K dem circa e z diametrum; a t d uero circa diametrum t h;
L quæ similes sint portioni a b l. transibit igitur a e i coni
sectio per K: & quæ ab r ducta est perpendicularis ad b d,
ipsam a e i secabit. secet in punctis y g: & per y g ducan
tur ipsi b d æquidistantes p y q, o g n, quæ secent a t d in
f x. ducantur postremo, & p χ, o φ contingentes sectionē
M a p o l in punctis p o. cū ergo tres portiones sint a p o l,
a e i, a t d, contentæ rectis lineis, & rectangulorum cono-
rum sectionibus; rectæq, similes, & inæquales, quæ contin
gunt se se super unamquanque basim: à puncto autem n
sursum ducta sit n x g o; & à q ipsa q f y p: habebit o g ad
g x proportionem compositam ex proportione, quam ha
bet i l ad l a; & ex proportione, quam a d habet ad d i.
Sed i l ad l a
habet eandem,
quam duo ad
quinque. ete-
N nim c b ad b d
est, ut sex ad
quindecim; hoc
est ut duo ad
O quinque: & ut
c b ad b d, ita
e b ad b a: &
d z ad d a. ha-
P rum autē d z,
d a duplæ sunt
Q ipsæ l i, l a: &
a d ad d i eā pro



portionem habet, quam quinque ad unum. sed proportio
composita ex proportione, quam habet duo ad quinque;
& ex proportione, quam quinque ad unum; est eadem,
quam habent duo ad unum: duo autem ad unum duplam
proportionem habent. dupla est igitur g b ipsius g x: &
eadem

eadem ratione ostẽdetur p y ipsius y f dupla. Itaque quoniam d s sesquialtera est ipsius k r; erit b s excessus, quo axis est maior, quàm sesquialter eius, quæ usque ad axem. Si igitur portio ad humidũ in grauitate eã habet proportionem, quam quadratum, quod fit à linea b f ad quadratum, quod à b d, aut maiorem; in hnmidum demissa, ita ut basis ipsius non contingat humidum, recta consistet. de monstratum est enim superius, portionem, cuius axis est maior, quàm sesquialter eius, quæ usque ad axem, si ad humidum in grauitate non minorem proportionem habeat, quàm quadratum, quod fit ab excessu, quo axis maior est, quam sesquialter eius, quæ usque ad axem, ad quadratum, quod ab axe; demissam in humidum, ita ut dictum est, rectam consistere. R

COMMENTARIVS.

QVAE hac decima propositione continentur, Archimedes in quinque partes dissecuit, & singulas seorsum demonstrauit.

Nonnunquam quidem recta consistat.] *Hæc est prima pars, cuius demonstrationem statim subiungit.* A

Et interdum adeo inclinata, ut basis ipsius in uno puncto contingat superficiem humidi; idq; in duabus dispositionibus.] *Demonstratum est illud in tertia parte.* B

Interdum ita, ut basis in humidum magis demergatur.] *Pertinet id ad quartam partem.* C

Interdum uero ita, ut superficiem humidi nullo modo contingat.] *Hoc duobus item modis fit, quorum unus in secunda, alter in quarta parte explicatur.* D

Secundum proportionem, quam habet ad humidum in grauitate.] *In translatione ita legebatur, quam autem proportionem habet ad humidum in grauitate.* E

Constat igitur k c maiorem esse, quàm quæ usque ad axem.] *Nam cum b d ad k c eandem habeat proportionem, quam* F

quindecim ad quatuor; & ad eam, quæ usque ad axem maiorem pro
10. quinti portionem habeat: erit quæ usque ad axem minor ipsa k c.

G Sit ei, quæ usque ad axem æqualis k r.] *Hæc nos addidimus, quæ in translatione non erant.*

H Est autem & s b sesquialtera ipsius b r.] *Ponitur enim d b sesquialtera ipsius b k; itémq; d ſ sesquialtera k r. quare ut to*
19. quinti *ta d b ad totam b K, ita pars d s ad partem K r. ergo & reliqua s b ad reliquum b r, ut d b ad b k.*

K Quæ similes sint portioni a b l.] *Similes portiones coni sectionum Apollonius ita diffiniuit in sexto libro conicorum, ut scribit Eutocius,* ἐν οἷς ἀχθεισῶν ἐν ἑκάστῳ παραλλήλων τῇ βάσει, ἴσων τὸ πλῆθος, αἱ παράλληλοι, καὶ αἱ βάσεις πρὸς τὰς ἀποτεμνομένας ἀπὸ τῶν διαμέτρων ταῖς κορυφαῖς ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις εἰσί, καὶ αἱ ἀποτεμνόμεναι πρὸς τὰς ἀποτεμνομένας; *hoc est. in quibus si ducantur lineæ æquidistantes basi numero æquales: æquidistantes atq; bases ad partes diametrorum, quæ ab ipsis ad uerticem abscinduntur, eandem proportionem habent: itémq; partes abscissæ ad abscissas. ducuntur autem lineæ basi æquidistantes: ut opinor, descripta in sin*
γραμμως *gulis plane rectilinea figura, quæ lateribus numero æqualibus conti neatur. Itaq; portiones similes à similibus coni sectionibus abscindũ tur: & earum diametri siue ad bases rectæ, siue cum basibus æquales angulos facientes, ad ipsas bases eandem habent proportionem.*

L Transibit igitur a e i coni sectio per k.] *Si enim fieri po test non transeat per k, sed per aliud punctum lineæ d b, ut per u. Quoniam igitur in rectanguli coni sectione a e i, cuius diameter e z, ducta est a e, & producta: & d b diametro æquidistans utrasque a e, a i secat; a e quidem in b, a i uero in d: habebit d b ad b u proportionem eandem, quam a z, ad z d, ex quarta propositione li bri Archimedis de quadratura paraboiæ. Sed a z sesquialtera est ipsius z d: est enim ut tria ad duo, quod mox demonstrabimus. ergo d b sesquialtera est ipsius b u. est autẽ d b & ipsius b k sesquialte*
9. quinti. *ra. quare lineæ b u, b k inter se æquales sunt; quod fieri non po test. rectanguli igitur coni sectio a e i per punctum k transibit. quod demonstrare uolebamus.*

Cum

Cum ergo tres portiones sint a p o l, a e i, a t d, contentæ rectis lineis, & rectãgulorum conorum sectionibus; rectæq;, similes, & inæquales, quæ contingunt se se super unam quamque basim.] *Post ea uerba, super unamquanque basim, in translatione aliqua desiderari uidentur. Ad horum autem demonstrationem non nulla præmittere oportet, quæ etiam ad alia, quæ sequuntur, necessaria erunt.* M

LEMMA I.

Sit recta linea a b, quam secent duæ lineæ inter se æquidistantes a c, d e, ita ut quam proportionem habet a b ad b d, eandem habeat a c ad d e. Dico lineam, quæ c b puncta coniungit, etiam per ipsum e transire.

SI enim fieri potest, non transeat per e, sed nel supra, uel infra. transeat primum infra, ut per f. erunt triangula a b c, d b f inter se similia. quare ut a b ad b d, ita a c ad d f. sed ut a b ad b d, ita erat a c ad d e. ergo d f ipsi d e æqualis erit, uidelicet pars toti, quod est absurdum. Idem absurdum sequetur, si linea c b supra e punctum transire ponatur. quare c b etiam per e necessario transibit. quod oportebat demonstrare. 4. sexti. 9. quinti.



LEMMA II.

Sint duæ portionis ſimiles, contentæ rectis lineis, & rectangulorum conorum ſectionibus; a b c quidem maior, cuius diameter b d; e f c uero minor, cuius diameter f g: aptenturq; inter ſeſe, ita ut maior minorem includat & ſint earum baſes a c, e c in eadem recta linea, ut idē punctum c ſit utriuſque terminus: ſumatur deinde in ſectione a b c quodlibet punctum h: & iungatur h c. Dico lineam h c ad partem ſui ipſius, quæ inter c, & ſectionem e f c interiicitur, eam proportionē habere, quam habet a c ad c e.

DVCATVR *b c, quæ tranſibit per f. quoniam enim portiones ſimiles ſunt, diametri cū baſibus æquales continent angulos. quare æquidiſtant inter ſeſe b d, f g: eſtq; b d ad a c, ut f g ad e c: & permutando b d ad f g, ut a c ad c e: hoc eſt ut earum dimidiæ d c ad c g. ergo ex antecedēti lēmate ſequitur lineā b c per punctum f tranſire.*

15. quinti.



Ducatur præterea à puncto h ad diametrum b d linea h k, æquidiſtans baſi a c: & iuncta k c, quæ diametrum f g ſecet in l; per l ducatur

ad

ad sectionem e f g ex parte e linea l m, eidem a c basi æquidistans. Sit autem sectionis a b c, linea b n iuxta quam possunt, quæ à sectione ducuntur: & sectionis e f c sit ipsa f o. quoniam igitur triangula c d b, c f g similia sunt, erit ut b c ad c f, ita d c ad c g; & b d ad f g. rursus quoniam triangula c k b, c l f etiã inter se sunt similia, ut b c ad c f, hoc est ut b d ad f g, ita erit k c ad c l; & b K ad f l. quare K c ad c l, & b k ad f l sunt ut d c ad c g: hoc est ut earum duplæ a c ad c e. sed ut b d ad f g, ita d c ad c g; hoc é ad ad e g: & permutãdo ut b d ad a d, ita f g ad e g. quadratum autem a d æquale est rectangulo d b n ex undecima primi conicorum. ergo tres lineæ b d, a d, b n inter se sunt proportionales. eadem quoque ratione cum quadratum e g æquale sit rectangulo g f o, tres aliæ lineæ f g, e g, f o, deinceps proportionales erũt. & ut b d ad a d, ita f g ad e g. quare ut a d ad b n, ita e g ad f o. ex æquali igitur, ut d b ad b n, ita g f ad f o: & permutando ut d b ad g f, ita b n ad f o. ut autem d b ad g f, ita b k ad f l. ergo b k ad f l, ut b n ad f o: & permutando, ut b k ad b n, ita f l ad f o. Rursus quoniã quadratũ h K æquale est rectangulo k b n: & quadratum m l rectangulo l f o æquale: erunt tres lineæ b k, k l, b n proportionales: tẽmq; proportionales inter se f l, l m, f o. quare ut linea b K ad lineam b n, ita quadratum b K ad quadratum h k: & ut linea f l ad ipsam f o, ita quadratũ f l ad quadratum l m. Itaque quoniam, ut b K ad b n, ita est f l ad f o; erit ut quadratum b K ad quadratum κ h, ita quadratum f l ad l m quadratum. ergo ut linea b k, ad lineam K h, ita linea f l ad ipsã l m: & permutãdo ut b k ad f l, ita k h ad l m. sed b k ad f l erat ut k c ad c l. ergo k h ad l m, ut K c ad c l. quare ex eodem lemmate patet lineam h c, & per m punctum transire. ut igitur K c ad c l: hoc est ut a c ad c e, ita h c ad c m; hoc est ad eam ipsius partem, quæ inter c, & e g c sectionem interyicitur. similiter demonstrabimus idem contingere in alijs lineis, quæ à puncto c ad a b c sectionem perducuntur. At uero b c ad e f eandem proportionem habere, liquido apparet; nam b c ad c f, est ut d c ad c g; uidelicet ut earum duplæ, a c ad c e.

4. sexti.

15. quinti.

17. sexti.

11. primi conicorũ

cor. 20. sexti.

22. sexti

Ex quibus perſpicuum eſt lineas omnes ſic ductas ab ipſis ſectionibus in eandem proportionem ſecari. eſt enim diuidendo, conuertendoq; c m ad m h, & c f ad f b, ut e e ad e a.

LEMMA III.

Sed & illud conſtare poteſt; lineas, quæ in portionibus eiuſmodi ſimilibus ita ducuntur, ut cũ baſibus æquales angulos contineant, ab ipſis ſimiles quoque portiones abſcindere: hoc eſt, ut in propoſita figura, portiones h b c, m f c, quas lineæ c h, c m abſcindunt, etiam inter ſe ſimiles eſſe.

DIVIDANTVR *enim c h, c m bifariam in punctis p q: & per ipſa ducantur lineæ r p s, t q u diametris æquidiſtantes. erit portionis h s c diameter p s, & portionis m u c diameter q u. Itaque fiat ut quadratum c r ad quadratum c p, ita linea b n ad aliam lineam, quæ ſit s x: & ut quadratum c t ad quadratum c q, ita fiat f o ad u y. iam ex iis quæ demõſtrauimus in commentarijs in quartam propoſitionẽ Archimedis de conoidibus, & ſphæroidibus, patet quadratum c p æquale eſſe rectangulo p s x:*



itẽmq;

itémq; quadratum c q æquale rectangulo q u y, hoc est sectionum h s c, m u c lineas s x, u y, eas esse, iuxta quas possint, quæ à sectione ad diametrum ducuntur. sed cú triangula c p r, c q t similia sint, habebit c r ad c p eandem proportionem, quam c t ad c q: & idcirco quadratum c r ad quadratum c p eandem habebit, quam quadratum c t ad quadratum c q. ergo & linea b n, ad lineam s x ita erit, ut linea f o ad ipsam u y. erat autem h c ad c m, ut a c ad c e. quare & earum dimidiæ c p ad c q, ut a d ad e g: & permutando c p ad a d, ut c q ad e g. Sed ostensum est a d ad b n ita esse, ut e g ad f o: & b n ad s x, ut f o ad u y. ergo ex æquali c p ad s x erit, ut c q ad u y. Quòd cum quadratú c p æquale sit rectangulo p s x & quadratum c q rectangulo q u y, erunt tres lineæ s p, p c, s x proportionales; itemq; proportionales ipsæ u q, q c, u y. quare & s p ad p c, ut u q ad q c: & ut p c ad c b, ita q c ad c m. ex æquali igitur ut portionis h s c diameter s p ad eius basim c b, ita portionis m u s diameter u q ad basim c m. & anguli, quos diametri cum basibus continent, sunt æquales, quòd lineæ s p, u q sibi ipsis æquidistent. ergo & portiones h s c, m u c inter se similes erunt. id quod demonstrandum proponebatur. 22. sexti

LEMMA IIII.

Sint duæ lineæ a b, c d, quæ secentur in punctis e f, ita ut quam proportionem habet a e ad e b, habeat c f ad f d: rursus secentur in aliis duobus punctis g h; & habeat c h ad h d eandem proportionem, quam a g ad g b. Dico c f ad f h ita esse, ut a e ad e g.

QVONIAM enim ut a e ad e b, ita c f ad f d, erit componendo ut a b ad e b, ita c d ad f d. Rursus cum sit ut a g ad g b, ita c h ad h d; componendo, conuertendoq; ut g b ad a b, ita erit h d ad c d. ergo ex æquali, conuertendoq; ut c b ad g b, ita f d ad h d:

& per conuersionem rationis ut e b ad e g, ita f d ad f h. est autem ut a e ad e b, ita c f ad f d. ex æquali igitur ut a e ad e g, ita c f ad f h.



ALITER. Aptentur lineæ a b, c d inter se se, ita ut ad partes a c angulum faciant; & sint a c in uno atque eodem puncto: deinde iungantur d b, h g, f e. cum igitur sit ut a c ad e b, ita c f, hoc est
2. sexti: a f ad f d; æquidistabit f e ipsi d b: & similiter h g eidem d b
30. primi æquidistabit: quoniam a h ad h d est, ut a g ad g b. ergo f c, h g inter se se æquidistant: & idcirco ut a e ad e g, ita a f; hoc est c f ad f h. quod demonstrare oportebat.

LEMMA V.

Sint rursus duæ portiones similes, contentæ rectis lineis, & rectangulorum conorum sectionibus, ut in superiori figura a b c, cuius diameter b d: & e f c, cuius diameter f g: ducaturq; à puncto e linea e h, diametris b d, f g æquidistans, quæ sectionem a b c in k secet: & à puncto c ducatur c h contingens sectionem a b c in c. conueniensq; cum linea e h in h, quæ sectionem quoque e f c in eodem c puncto continget, ut demonstrabitur. Dico lineam ductam ab ipsa c h usque ad sectionem e f c, ita ut lineæ e h æquidistet, in eandem proportionem diuidi à sectione a b c; in quam linea c a à

sectio

ſectione e f c diuiditur: pars uero lineæ c a, quæ eſt inter duas ſectiones proportione reſpondebit parti lineæ ductæ, quæ itidem inter eaſdem ſectiones interiicitur; hoc eſt ut in propoſita figura, ſi producatur d b uſque ad c h in l, ut ſectioni e f c in puncto m occurrat; lineam l b ad b m eãdem proportionem habere, quàm c e ad e a.

Producatur enim q f ad eandem lineã c h in n, ſecãs a b c ſectionem in o: & iuncta b c, quæ tranſibit per f, ut oſtenſum eſt, erunt triangula c g f, c d b ſimilia: itémq; ſimilia iter ſe, c f n, c b l. quare ut g f ad d b, ita erit c f ad c b: & ut c f ad c b, ita f n ad b l. ergo g f ad d b, ut f n ad b l: & permutando g f ad f n, ut d b ad b l. eſt autem d b æqualis ipſi b l ex trigeſimaquinta primi libri conicorum. ergo & g f ipſi f p æqualis erit: & ex trigeſimatertia eiuſdem linea c h ſectionem e f c in eodem pun-



4. ſexti:

11. quinti

14. quinti

cto continget. Itaque iuncta c m producatur ad sectionem a b c in p & à p ad a c ducatur p q, quæ ipsi b d æquidistet. quoniam igitur linea c h contingit sectionem e f c in c puncto; habebit l m ad m d proportionem eandem, quam c d ad d e, ex quinta propositione Archimedis in libro de quadratura parabolæ. & propter triá gulorum c m d, c p q similitudinem, ut c m ad c d, ita erit c p ad c q: permutandoq; ut c m ad c p, ita c d ad c q. ut autem c m ad c p, sic c e ad c a: quod proxime demõstrauimus. quare ut c e ad c a, sic c d ad c q: hoc est ut totum ad totum, sic pars ad partem, reliquum igitur d e ad reliquum q a est ut e e ad c a; uidelicet ut c d ad c q: & permutando c d ad d e, ut c q ad q a. êstq; l m ad m d, ut c d ad d c. ergo l m ad m d, ut c q ad q a. sed l b ad b d ex quinta Archimedis, quam diximus; est ut c d ad d a. constat igitur ex antece-



2. sexti. denti lemmate c d ad d q ita esse, ut l b ad b m. ut autem c d ad d q, ita c m ad m p. ergo l b ad b m, ut c m ad m p. Quòd cum demonstratum fuerit, c m ad m p, ut c e ad e a: habebit l b ad b m eandẽ propor

proportionem, quam c e ad e a. similiter demonstrabitur eandem habere n o ad o f: & reliquas eiusmodi. at uero h K ad K e eam habere proportionem, quam habet c e ad e a, ex eadem quinta Archimedis perspicue apparet. atque illud est, quod demonstrandum proposuimus.

LEMMA VI.

Itaque maneant eadem, quæ supra: & itidem describatur alia portio similis contenta recta linea & rectanguli coni sectione d r c; cuius diameter r s, ut secet lineam f g in t: producaturque s r ad lineam c h in u; cui sectio a b c occurrat in x, & e f c in y. Dico b m ad m d proportionem habere compositam ex proportione, quam habet e a ad a c; & ex ea, quam c d habet ad d e.

SIMILITER *enim ut supra, demonstrabimus lineam c h contingere sectionẽ d r c in c puncto: & l m ad m d, itêmq; n f ad f t; & u y ad y r ita esse, ut c d ad d e. Quoniam igitur l b ad b m est, ut c e ad e a; erit componendo, conuertendóq; b m ad l m, ut e a ad a c: & ut l m ad m d, ita c d ad d e. proportio autem b m ad m d composita est ex proportione, quam habet b m ad l m, & ex proportione, quam l m habet ad m d. ergo proportio b m ad m d etiam composita erit ex proportione, quam habet e a, ad a c; & ex ea, quam c d habet ad d e. Eadem ratione demonstrabitur o f ad f t; itêmq; x y ad y r proportionem habere ex eisdem proportionibus compositam: & ita in alijs. quod demonstrare oportebat.*

Ex quibus apparet lineas sic ductas, quæ inter sectiones a b c, d r c interiiciuntur à sectione e f c in eandem proportionem diuidi.

UNIVERSIDAD DE MURCIA

N Etenim c b ad b d est ut sex ad quindecim.] *Posuimus enim b K duplam esse ipsius K d. quare componendo b d ad k d erit, ut tria ad unum; hoc est ut quindecim ad quinque. sed b d ad K c erat ut quindecim ad quatuor. ergo b d ad d c, ut quindecim ad nouem: & per conuersionem rationis, conuertendoq; c b ad b d, ut sex ad quindecim.*



O Et ut c b ad b d, ita e b ad b a, & d z ad d a.] *Nam cum triangula c b e, d b a sint similia, erit ut c b ad b e, ita d b, ad b a & permutando, ut c b ad b d; ita e b ad b a. Rursus ut b c ad c e, ita b d ad d a: permutandoq; ut c b ad b d, ita c e, hoc est d z ci æqualis ad d a.*

P Harum autem d z d a duplæ sunt ipsæ l i, l a.] *Lineam quidem l a duplam esse ipsius d a, cum b d sit portionis diameter, manifeste constat. At uero l i ipsius d z dupla hoc pacto demonstrabitur. Quoniam enim z d ad d a est, ut duo ad quinque; erit conuertendo, diuidendoq; a z, hoc est i z ad z d, ut tria ad duo: & rursus diuidendo i d ad d z, ut unum ad duo. erat autem z d ad d a, hoc est ad d l, ut duo ad quinque. ergo ex æquali, conuertendoq; l d ad d i, ut quinque ad unum: & per conuersionem rationis d l ad l i, ut quinque ad quatuor. sed d z ad d l erat, ut duo ad quinque. ergo rursus ex æquali d z ad l i, ut duo ad quatuor. dupla est igitur l i ipsius d z. quod demonstrandum fuerat.*

Q Et a d ad d i eam proportionem habet, quã quinque ad

ad unum.] *Hoc nos proxime demonſtrauimus.*

Demonſtratum eſt enim ſuperius portionem cuius axis R
eſt maior, quàm ſeſquialter eius, quæ uſque ad axem, ſi ad humidum in grauitate non minorem proportionem habeat &c.] *Illud uero demonſtrauit in quarta propoſitione huius libri.*

I I.

Si portio ad humidum in grauitate minorem A
quidem proportionem habeat, quàm quadratum ſ b ad quadratum b d; maiorem uero, quàm quadratum x o ad quadratum b d; demiſſa in humidum, adeo inclinata, ut baſis ipſius non contingat humidum, inclinata conſiſtet; ita ut baſis ſuperficiem humidi nullo modo contingat; & axis cum humidi ſuperficie angulum faciat maiorem angulo χ.

I I I.

Si portio ad humidum in grauitate, eam habeat proportionem, quam quadratum x o ad quadratum b d; demiſſa in humidum inclinata adeo, ut baſis ipſius non contingat humidum; conſiſtet, & manebit ita, ut baſis in uno puncto humidi ſuperficiem contingat: & axis cum ſuperficie humidi angulū faciat angulo χ æqualē. Quòd ſi portio ad humidum in grauitate eam proportionem habeat, quam quadratum p ſ ad

quadratum b d; in humidum demissa, & posita inclinata adeo, ut basis ipsius non contingat humidum; consistet inclinata, ita ut basis in uno puncto humidi superficiem contingat: & axis cũ ea faciat angulum angulo φ æqualem.

IIII.

B Si portio ad humidum in grauitate maiorem quidem proportionem habeat, quàm quadratum f p ad quadratum b d; minorem uero, quàm quadratum x o ad b d quadratum; in humidum demissa, & inclinata adeo, ut basis ipsius non contingat humidum consistet, & manebit ita, ut basis in humidum magis demergatur.

V.

Si portio ad humidum in grauitate proportionem habeat minorem, quàm quadratum f p ad quadratum b d: demissa in humidum, & posita inclinata adeo ut basis ipsius non contingat humidum: consistet inclinata, ita ut axis ipsius cum humidi superficie angulum faciat minorem angulo φ: & basis nullo modo superficiem humidi contingat. Hæc autem omnia deinceps demonstrabuntur.

DEMON

DEMONSTRATIO SECVNDAE PARTIS.

ITAQVE primum habeat portio ad humidum in grauitate proportionem quidem maiorem, quàm quadratum x o ad quadratum b d; minorem uero, quàm quadratum, quod fit ab exceſſu, quo axis eſt maior, quàm ſeſquialter eius, quæ uſque ad axem, ad quadratum b d: & quam proportionem habet portio ad humidum in grauitate, eã habeat quadratum, quod fit à linea ↓ ad quadratum b d: erit ↓ maior quidem, quàm x o, minor uero, quàm exceſſus, quo axis eſt maior, quàm ſeſquialter eius, quæ uſque ad axem. aptetur quædam recta linea m n conicis ſectionibus a m q l, a x d interiecta, ac media, quæ lineæ ↓ ſit æqualis; ſecetq; reliquã coni ſectionem in puncto h; & rectam lineam r g in u. demõſtrabitur m h dupla ipſius h n, ſicuti demonſtratum eſt o g ipſius g x duplam eſſe. à puncto autẽ m ducatur m y contingens ſectionem a m q l in m: & m c ad b d perpendicularis. poſtea ducta a n, & producta ad q lineæ a n, n q inter ſe æquales erunt. quoniã enim in ſimilibus portionibus a m q l, a x d ductæ ſunt à baſibus ad portiones lineæ a q, a n, quæ æquales angulos continent cum ipſis baſibus, eandem proportionem habebit q a ad a n, quam l a ad a d. æqualis eſt ergo a n ipſi n q; & a q



C D E F

G ipsi m y æquidistans. Demonstrandum est portionem in humidum demissam, inclinatamq; adeo, ut basis ipsius nō contingat humidum, inclinatam consistere ita, ut basis superficiem humidi nullo modo contingat: & axis cum ea faciat angulum angulo χ maiorem. Demittatur enim in humidum, consistatq; ita, ut basis ipsius in uno puncto cōtingat humidi superficiem: & secta ipsa portione per axem, plano ad humidi superficiem recto; superficiei quidē portionis sectio sit a p o l rectanguli coni sectio: superficiei humidi sectio sit a o: axis autem portionis, & sectionis diameter b d: & secetur b d in punctis k r, ut dictum est: ducatur etiam p g æquidistans ipsi a o, quæ sectionem a p o l contingat in p: atque ab eo puncto ducatur p t æquidistās ipsi b d; & p s ad b d perpendicularis. Itaque quoniam portio ad humidum in grauitate eam proportionem habet, quam quadratū, quod fit à linea ↓ ad quadratum b d: quā uerō proportionem habet portio ad humidū, eandem pars ipsius demersa habet ad totā portionē: & quam pars demersa ad totam, eandem habet quadratum t p ad b d quadratum: erit linea ↓ æqualis ipsi t p. quare & lineæ m n, p t; itemq; portiones a m q,



K a p o inter se sunt æquales. Quòd cum in portionibus æqua

æqualibus, & similibus, a p o l, a m q l ab extremitatibus basium ductæ sint a o, a q ita, ut portiones ablatæ faciant cum diametris angulos æquales; & anguli, qui ad y g: & lineæ y b, g b, & b c, b s inter se æquales erunt. quare & ipsæ c r, s r: & m u, p z: & u n, z t. Quoniam igitur m u minor est, quàm dupla u n; constat p z ipsius z t minorem esse, quàm duplam. Sit p ω dupla ipsius ω t: & iuncta ω k ad e producatur. ergo totius quidem portionis centrum grauitatis erit puntum k; partis eius, quæ in humido est, centrum ω; eius uero, quæ extra humidum in linea k e, quod sit e. Sed linea k z perpendicularis erit ad superficiem humidi. quare & lineæ quæ per puncta e, ω, æquidistantes ipsi k z ducuntur. non ergo manebit portio, sed reuoluetur ita, ut basis ipsius superficiem humidi nullo modo contingat: quoniã nunc in uno puncto contingens, sursum fertur ex parte a. perspicuum est igitur portionem consistere ita, ut axis cum superficie humidi faciat angulum maiorem angulo χ. L M N

COMMENTARIVS.

Si portio ad humidum in grauitate minorẽ proportionem habeat; quàm quadratum s b ad quadratum b d; maiorem uero, quàm quadratum x o ad b d quadratum.] *Hæc est secunda pars propositionis, quam aliæ deinceps, postea ipsarum demonstrationes eodem ordine sequuntur.* A

SI portio ad humidum in grauitate maiorem quidem proportionẽ habeat, quàm quadratũ f p ad quadratũb d.] *Hãc quartã partẽ nos restituimus, quæ ĩ trãslatione desiderabatur.* B

Erit ↓ maior quidem, quàm x o, minor uero, quàm excessus, quo axis est maior, quam sesquialter eius, quæ usque ad axem,] *Sequitur illud ex decima quinti libri elementorum.* C

Demonstrabitur m h dupla ipsius h n, sicuti demonstratũ est o g ipsius g x duplam esse.] *Vt in prima parte huius, & ex ijs, quæ nos proxime in ipsam conscripsimus.* D

Quoniam enim in similibus portionibus a p o l, a x d, E

ductæ sunt à basibus ad portiones lineæ a n, a q, quæ angulos æquales continent cum ipsis basibus, eandem proportionem habebit q a ad a n, quam l a ad a d.] *Hoc nos supra demonstrauimus.*

F Æqualis est ergo a n ipsi n q.] *Cum enim q a ad a n sit, ut l a ad a d; diuidendo, conuertendoq; erit a n ad n q, ut a d ad d l. est autem a d æqualis ipsi d l, quoniam d b ponitur diameter portionis. ergo & a n ipsi n q est æqualis.*

14. quinti

G Et a q ipsi m y æquidistans.] *Ex quinta secundi libri conicorum Apollonij.*

H Et secetur b d in punctis k r, ut dictum est.] *In prima parte huius propositionis. secetur autem in K ita, ut b k sit dupla ipsius k d; & in r, ut K r sit æqualis ei, quæ usque ad axem.*

K Quòd cũ in portionibus æqualibus, & similibus, a p o l, a m q l ab extremitatibus basium ductæ sint a o, a q, ita ut portiones ablatæ faciant cum diametris angulos æquales: & anguli, qui ad y g: & lineæ y b, g b inter se æquales erũt.] *Secet linea a q diametrum d b in ϑ, & a o secet in ν. Itaque quoniam in portionibus æqualibus, & similibus a p o l, a m q l ab extremitatibus basium ducũtur a o, a q, quæ æquales angulos continent cum ipsis basibus: & anguli ad d utrique sunt recti: erũt & reliqui a ν d, a ϑ d inter se æquales. linea autem p g æquidistat lineæ a o: itemq; m y ipsi a q: & p s, m c ipsis a d. triangula igitur p g s, m y c triangulis a ν d a ϑ d, atque inter se sunt similia: & ut a d ad a ν, ita a d ad a ϑ: & permutando. li-*



4. sexti.

neæ

neæ autem a d inter se æquales sunt. ergo & ipsæ a ν, a ϐ. Sed sunt æquales a o, a q: & earum dimidiæ a t an. ergo & reliquæ t ν, n ϐ; hoc est p g, m y. ut autem p g ad g h, ita m y ad y c; & permutando, ut p g ad m y, ita g s ad y c. quare g s, y c æquales sunt: & ipsarum dimidiæ b s, b c: ex quibus sequitur ut & reliquæ s r, c r: & idcirco p z, m u & u n, z t inter se sunt æquales. 34. primi

Quoniam igitur m u minor est, quàm dupla u n.] *Est enim m h ipsius h n dupla, & m u minor ipsa m h. ergo m u minor est, quàm dupla h n; & multo minor, quàm dupla ipsius u n.* L

Non ergo manebit portio, sed reuoluetur, ita ut basis ipsius humidi superficiem nullo modo contingat. quoniam nunc in uno puncto contingens sursum fertur ex parte a.] *Translatio sic habet. non ergo manet portio sed inclinabitur, ut basis ipsius nec secundum unum tangat superficiem humidi, quoniam nunc secundum unum tacta ipsa reclinatur. Quæ nos ex alijs Archimedis locis, & perspicuitatis caussa in eum modum corrigenda duximus. In sexta enim propositione huius ita scribit, ut habetur in translatione. reuoluetur ergo solidum a p o l, & basis ipsius nō tanget superficiem humidi secundum unum signum. Rursus in septima propositione. manifestum igitur, quòd reuoluetur solidum ita ut basis ipsius nec secundum unum signum contingat superficiem humidi, quoniam nunc secundum unum tangens deorsum fertur ex parte l. At uero portionem sursum ferri ex parte a manifeste constat. nam cum perpendicularis ad superficiem humidi, quæ transit per ω ad partes a cadat, & quæ per e ad partes l, necesse est ut centrum ω sursum, e uero deorsum feratur.* M

Perspicuum est igitur portionem consistere ita, ut axis cum superficie humidi faciat angulum maiorem angulo χ.] *Iuncta enim a x producatur, ut diametrum b d secet in λ, & ab o puncto ipsi æquidistans ducatur o χ. continget ea sectionem in o, ut in prima figura: atque erit angulus ad χ angulo ad λ æqualis. Sed angulus ad y æqualis est angulo ad ϐ: & angulus a ϐ d maior angulo a λ d; quod extra ipsum cadat. ergo angulus ad y eo, qui ad χ maior erit.* N 29. primi 16. primi.

Quoniam igitur portio conuertitur, ita ut basis humidum non contingat, axis cum superficie eius faciet angulum maiorem angulo g; hoc est angulo y: & propterea multo maiorem angulo χ.



DEMONSTRATIO TERTIAE PARTIS.

HABEAT deinde portio ad humidum eam in grauitate proportionem, quam quadratũ x o habet ad quadratum b d: & in humidum demittatur adeo inclinata, ut basis ipsius non contingat humidum. Secta aũt ipsa per axem plano ad humidi superficiem recto, solidi sectio sit rectanguli coni sectio a p m l: superficiei humidi sectio sit i m: axis portionis, & sectionis diameter b d: seceturq; b d sicuti prius: & ducatur p n quidem



ipsi

ipſi i m æquidiſtãs, & contingens ſectionem in p; p t uero æquidiſtans b d; & p s ad ipſam b d perpendicularis. Demõſtrandũ eſt, portionẽ non cõſiſtere ita, ſed inclinari, donec baſis in uno puncto ſuperficiem humidi cõtingat. Maneãt enim eadem, quæ in ſuperiori figura: ducaturq; o c ad b d perpendicularis: & iuncta a x ad q producatur. erit a x æqualis ipſi x q. deíde ducatur o χ ipſi a q æquidiſtãs. Quoniã igitur portio ad humidũ eã in grauitate proportionẽ habere ponitur, quam quadratum x o ad quadratum b d: & eandem proportionem habet pars ipſius demerſa ad totam; hoc eſt quadratum t p ad quadratum b d: æqualis utique erit t p ipſi x o: cumq; portionum i p m, a o q diametri ſint æquales, & portiones ipſæ æquales erunt. Rurſus B



quoniam in portionibus æqualibus, & ſimilibus a o q l, a p m l, ductæ ſunt lineæ a q, i m, quæ æquales portiones auferunt; illa quidem ab extremitate baſis, hæc autem non ab extremitate: cõſtat eam, quæ ab extremitate baſis ducta eſt, minorem facere angulum acutũ cum diametro totius portionis. & quoniam angulus, qui D ad χ minor eſt angulo, qui ad n; maior erit b c, quàm b s: c r autem, quàm ſ r minor. quare & o g minor, quàm p z: & g x maior, quàm z t. ergo p z maior eſt, quàm dupla z t;

quia o g ipsius g x est dupla. Sit p h dupla h t: & iuncta h k ad ω producatur. erit totius quidem portionis centrum grauitatis k; partis eius, quæ intra humidum h; eius uero, quæ extra humidum in linea k ω, quod sit ω. Itaque demonstrabitur similiter & k z ad humidi superficiem perpẽdicularis, & quæ per puncta h ω æquidistantes ipsi k z ducuntur. quare nõ manebit portio, sed inclinabitur, donec basis ipsius in uno pũcto contingat superficiem humidi: atque ita consistet. nam in portionibus æqualibus a o q l, a p m l, ductæ erunt ab extremitatibus basium a q, a m, quæ æquales portiones abscindunt: etenim a o q



E ipsi a p m, ut in superioribus æqualis demonstrabitur. ergo æquales faciunt acutos angulos a q, a m cum diametris basium: quòd anguli ad χ & n æquales sint. quare si ducta h k ad ω producatur, erit totius portionis grauitatis centrum k; partis eius, quæ in humido h; at eius, quæ extra humidum in linea h κ; quod sit ω: & h k ad humidi superficiem perpendicularis. per easdem igitur rectas lineas, quod quidem in humido est, sursum, & quod extra humidum deorsum feretur. quare manebit portio, cuius basis humidi superficiem in uno puncto continget: & axis cum

F ipsa angulum faciet æqualem angulo χ. Similiter demonstrabitur

strabitur portionem, quæ ad humidum in grauitate eandē proportionem habeat, quàm quadratum p f ad quadratū b d in humidum demissam, ita ut basis ipsius nō cōtingat humidum, inclinatam consistere adeo, ut basis in uno puncto humidi superficiem contingat. & axis cum ipsa faciat angulum angulo φ æqualem.

COMMENTARIVS.

Hoc est quadratum t p ad quadratum b d.] *Ex uigesima sexta libri Archimedis de conoidibus, & sphæroidibus. ergo ex nona quinti erit quadratum t p æquale quadrato x o: & propterea linea t p lineæ x o æqualis.* A

Et portiones ipsæ æquales erunt.] *Ex uigesima quinta eiusdem libri.* B

Rursus quoniam in portionibus æqualibus, & similibus a o q l, a p m l.] *In portione enim a p m l describatur portio a o q æqualis portioni i p m, cadet punctum q infra m, alioqui totum parti esset æquale. Ducatur deinde i u æquidistans a q,* C



quæ diametrum secet in ↓; secet autem i m eandem in σ: & a q in υ. Dico angulum a υ d angulo i σ d minorẽ esse. angulus enim i ↓ d
29. primi 16. primi *æqualis est angulo a υ d. sed angulus interior i ↓ d minor est exteriore i σ d. ergo & a υ d ipso i σ d minor erit.*

D Et quoniam angulus, qui ad χ minor est angulo, qui ad n.] *Ducantur per o duæ lineæ, o c quidem ad diametrum b d perpendicularis: & o χ in puncto o sectionem contingens, quæ diametrum secet in χ. æquidistabit o χ ipsi a q: atque erit angulus ad*
35. secũdi conicoũ 29. primi. 35. primi conicorũ *χ æqualis ei, qui ad υ. ergo angulus ad χ angulo ad σ, uidelicet eo, qui ad n minor erit: & propterea χ infra n cadet. linea igitur χ b maior est, quàm n b. Sed cum b c sit æqualis χ b, & b s ipsi n b: erit b c ipsa b s maior.*

E Ergo æquales faciunt angulos a q, a m cum diametris portionum.] *Hoc demonstrabimus ut in commentarijs in secundam partem.*

F Similiter demonstrabitur, portionem, quæ ad humidũ in grauitate eandem proportionem habeat, quã quadratum p f ad quadratũ b d; in humidum demissam, ita ut basis ipsius non cõtingat humidum, inclinatam consistere adeo, ut basis in uno pũcto humidi superficiem cõtingat: & axis cũ ipsa faciat angulũ angulo φ æqualẽ]



Habeat portio ad humidum in grauitate proportionem eam, quam p f quadratum ad quadratum b d: & demissa in humidum adeo inclinata,

clinata, ut basis humidum non contingat, secetur plano per axem, recto ad superficiem humidi, ut sectio sit a m o l rectanguli coni sectio: superficiei humidi sectio sit i o: axis portionis, & sectionis diameter b d; quæ in easdem, quas diximus, partes secetur: ducaturq; m n quidem ipsi i o æquidistans, ut in puncto m sectionem cõtingat: m t uero æquidistans ipsi b d: & m s ad eandem perpendicularis. Demonstrandum est non manere portionem, sed inclinari ita, ut in uno puncto contingat superficiem humidi. ducatur enim p c ad ipsam b d perpendicularis: & iuncta a f usque ad sectionem producatur in q: & per p ducatur p φ ipsi a q æquidistans. erunt iam ex ijs, quæ demonstrauimus a f, f q inter se se æquales. & cum portio ad humidum eam in grauitate proportionem habeat, quã quadratũ p f ad b d quadratum: atque eandem habeat portio ipsius demersa ad totam portionem; hoc est quadratũ m t ad quadratũ b d: erit quadratum m t quadrato p f æquale: & idcirco linea m t æqualis lineæ p f. Itaque quoniam in portionibus æqualibus, & similibus a p q l, a m o l ductæ sunt lineæ a q, i o, quæ æquales portiones abscindunt; illa quidem ab extremitate basis; hæc uero non ab extremitate: sequitur ut a q, quæ ab extremitate ducitur, minorem acutum angulũ contineat cum diametro portionis, quàm ipsa i o. Sed linea p φ lineæ a q æquidistat, & m n ipsi i o. angulus igitur ad φ angulo ad n



9. quinti.

minor erit: linea uero b c maior, quàm b s: & s r; hoc est m χ maior, quàm c r, hoc est, quàm p y: & propterea χ t minor, quàm y f. quòd cum p y sit dupla y f, erit m χ maior, quàm dupla y f; & multo maior, quàm dupla χ t. fiat m h dupla ipsius h t: & copulata h k producatur. Iam grauitatis centrum totius portionis erit punctum κ: eius, quæ in humido est, h: at reliquæ partis, quæ extra humidum in linea h k producta; quod sit ω. eodem modo demonstrabitur, & lineam k h, & quæ per h ω puncta ipsi k h æquidistantes ducuntur, ad humidi superficiem perpendiculares esse. non igitur manebit portio, sed cum usque eò inclinata fuerit, ut in uno puncto contingat superficiē humidi, tunc consistet. angulus enim ad n angulo ad φ æqualis erit; lineâq; b s lineæ b c; & s r ipsi c r. quare & m h ipsi p y est æqualis. Itaque ducta h k producatur.



erit totius portionis grauitatis centrum κ; eius, quæ in humido est h; & reliquæ partis centrum in linea producta; sit autem ω. per eandem igitur rectam lineam k h, quæ est ad humidi superficiem perpendicularis, id quod in humido est sursum; & quod extra humidum deorsum feretur. atque ob hāc causſam portio non amplius mouebitur; sed consistet, manebitq, ita, ut eius basis superficiem humidi in uno puncto contingat; & axis, cum ipsa angulum faciat æqualem angulo φ. atque illud est, quod demonstrare oportebat.

DEMON

DEMONSTRATIO QVARTAE PARTIS.

HABEAT rursum portio ad humidum in grauitate proportionem quidem maiorem, quàm quadratum f p ad quadratum b d; minorem uero, quàm quadratum x o ad b d quadratum: & quam proportionem habet portio ad humidum in grauitate, eandem habeat quadratum, quod fit à linea ↓ ad quadratum b d. erit ↓ maior, quàm f p, & minor, quàm x o. aptetur ergo quædam recta linea i u inter portiones a u q l, a x d interiecta, quæ sit æqualis ↓, & ipsi b d æquidistans: occurratq; reliquæ sectioni in y. rursus u y dupla ipsius y i demonstrabitur, sicuti demonstrata est o g ipsius g x dupla. ducatur autem ab u linea u ω, quæ sectionem a u q l in u contingat: & iuncta a i ad q producatur. eodem modo ostendemus lineam a i ipsi i q æqualem esse: & a q ipsi u ω æquidistantem. Demonstrādum est portionem in humidum demissam, ĩclinatāq; adeo, ut basis ipsius non contingat humidū, ita consistere, ut basis in humidū magis demergatur quàm ut in uno puncto eius superficiem cōtingat. Demittatur enim in humidum, ut dictum est; & iaceat primo sic inclinata, ut basis nullo modo contingat superficiem humidi. secta autem ipsa plano per axem ad humidi



ſuperficiem recto, ſit portionis ſectio a n z g; ſuperficiei humidi e z: axis portionis, & ſectionis diameter b d: ſeceturq; b d in pũctis κ r, ſicuti prius; & ducatur n l quidem ipſi e z æquidiſtans, quæ contingat ſectionẽ a n z g in n; & n t æquidiſtans ipſi b d; n s uero ad b d perpẽdicularis. Itaq;



quoniam portio ad humidum in grauitate eam proportionem habet, quam quadratum, quod fit à linea ↓ ad quadratum b d: erit ↓ ipſi n t æqualis: quod ſimiliter demonſtrabitur, ut ſuperius. quare & n t eſt æqualis ipſi u i. portiones igitur a u q, e n z inter ſe ſunt æquales. Et cum in æqualibus, & ſimilibus portionibus a u q l, a n z g ductæ ſint a q e z, quæ æquales portiones auferunt; illa quidem ab extremitate baſis; hæc autem non ab extremitate: minorem faciet acutum angulum cum portionis diametro, quæ ab extremitate baſis ducitur. At triangulorum n l s, u ω c angulus ad l angulo ad ω maior eſt. ergo b s minor erit, quàm b c: & ſr maior, quàm c r: ideoq; n χ maior, quam u h; & χ t minor, quàm h i. Quoniam igitur u y dupla eſt ipſius y i; conſtat n χ maiorem eſſe, quàm duplã χ t. Sit n m dupla ipſius m t. perſpicuũ eſt ex iis, quæ dicta ſunt, non manere portionẽ; ſed inclinari, donec eius baſis contingat ſuperficiem humidi: contingat autem in puncto uno, ut patet in figura

gura: & alia eadem disponantur demonstrabimus rursum n t æqualem esse ipsi u i : & portiones a u q, a n z inter se se æquales.



Itaque quoniã in portionibus æqualibus, & similibus a u q l, a n z g ductæ sũt a q, a z, portiones æquales auferentes; cum diametris portionum æquales angulos cõtinebũt. ergo triangulorum n l s, u ω c anguli, qui cõsistũt ad l ω pũcta, æquales sunt: & b s recta linea æqualis ipsi b c: sr ipsi c r, n χ ipsi u h: & χ t ipsi h i. quòd cum u y dupla sit ipsius y i, erit n χ maior, quàm dupla χ t. Sit igitur n m ipsius m t dupla. Rursus ex his manifestum est, non manere ipsam portionem; sed inclinari ex parte a: ponebatur autem portio humidi superficiem in uno puncto contingere. ergo necesse est, ut eius basis in humidum magis demergatur.

DEMONSTRATIO QVINTAE PARTIS.

HABEAT denique portio ad humidum in grauitate minorem proportionem, quàm quadratum f p ad quadratum b d: & quam proportionem habet portio ad humidũ in grauitate, eandem quadratum, quod fit à linea ↓ habeat ad quadratum b d. erit ↓ minor ipsa p f. Rursus aptetur

quædam recta linea g i, sectionibus a g q l, a x d interiecta, & ipsi b d æquidistans; quæ mediam coni sectionem in puncto h, & rectam lineam r y in y secet. demonstrabitur g h dupla h i, quemadmodum demonstrata est o g ipsius g x dupla. ducatur postea g ω cõtingens a g q l sectionem in g: & g c ad b d perpẽdicularis: iunctaq; a i producatur ad q. erit ergo a i æqualis i q: & a q ipsi g ω



æquidistans. Demonstrandũ est portionẽ in humidũ demissam, inclinatamq; adeo, ut basis ipsius non cõtingat humidũ, consistere inclinatã ita, ut axis cum superficie humidi angulum faciat minorem angulo φ: & basis humidi superficiem nullo modo contingat. Demittatur enim in humidum; & consistat ita, ut basis ipsius in uno puncto contingat superficiem humidi. secta autem portione per axem, plano ad humidi superficiem recto, sit portionis sectio a n z l rectanguli coni sectio: superficiei humidi a z: axis autẽ portionis, & sectionis diameter b d: seceturq; b d in punctis K r, ut superius dictum est: & ducatur n f quidem ipsi a z æquidistans, & contingens coni sectionem in pũcto n; n t uero æquidistans ipsi b d: & n s ad eandem perpendicularis. Quoniam igitur portio ad humidum in grauitate, eam habet proportionem, quam quadratum, quod fit à ↓

ad

ad quadratum b d: & quam habet portio ad humidum in grauitate, eandem quadratum n t habet ad b d quadratũ, ex iis, quæ dicta sunt: constat n t lineæ ↓ æqualem esse, quare & portiones a n z, a g q sunt æquales. Et quoniam in portionibus æqualibus, & similibus a g q l, a n z l, ab extremitatibus basiũ ductæ sunt a q, a z, quæ æquales portiões abscindunt: per spicuum est angulos facere æquales cum portionum diametris: & triangulorum n f s, g ω c, angulos, qui ad f ω æquales esse: itemque æquales inter se, s b, c b; & s r, c r, quare & n χ, g y æquales: & χ t y i. cũq; g h dupla sit ipsius h i, erit n χ minor, quàm dupla ipsius χ t. Sit igitur n m ipsius m t dupla: & iuncta m K protrahatur ad e. Itaque centrum grauitatis totius erit punctum K: partis eius, quæ est in humido, punctũ m: eius autem, quæ extra humidum in linea protracta, quod sit e. ergo ex proxime demonstratis patet, nõ manere portionem, sed inclinari adeo, ut basis nullo modo superficiẽ humidi contingat. At uero portionem consistere ita, ut axis cum superficie humidi faciat angulum angulo φ minorem, sic demonstrabitur. consistat enim, si fieri potest, ut non faciat angulum minorem angulo φ: & alia eadem disponantur; ut in subiecta figura. eodem modo demonstra



bimus n t æqualem esse ♃, & propterea ipsi g i. & quoniam triangulorum p φ c, n f s angulus f non est minor angulo φ, non erit b f maior, quàm b c. ergo neque s r minor, quàm c r: neque n χ minor, quàm p y. Sed cum p f sit maior, quàm n t: sitq; p f sesquialtera p y: erit n t minor, quàm sesquialtera n χ: & idcirco n χ maior, quã dupla χ t. sit autẽ n m dupla m t: & iuncta m κ producatur. constat igitur ex iam dictis non manere portionem; sed reuolui ita, ut axis cum superficie humidi faciat angulum angulo φ minorem.



FINIS LIBRORVM ARCHIMEDIS DE IIS, QVAE IN AQVA VEHVNTVR.

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA